

## Argumentario del Día Mundial de Lucha contra el Sida

### ¿Qué es el Día Mundial de Lucha contra el sida?

El Día Mundial de Lucha contra el sida es el día escogido para recordar y dar a conocer al mundo la epidemia global del sida causada por la extensión de la infección del VIH.

### ¿Por qué se celebra el día 1 de diciembre?

El primer caso de sida del mundo se diagnosticó el 1 de diciembre de 1981. Es por ello que el Día Mundial de la Lucha contra el sida se celebra este día. Desde entonces se han producido más de 30 millones de muertes relacionadas con el VIH/sida en todo el mundo, convirtiéndose en una de las epidemias más destructivas de la historia.

### ¿Quién organiza el Día Mundial de Lucha contra el sida?

La idea de dedicar un día a la lucha contra el sida nació en la cumbre mundial de ministros de sanidad del año 1988, dentro de los programas de prevención del sida. Hasta el año 2004 ONUSIDA (UNAIDS) se encargaba de organizar esta jornada, eligiendo un tema para cada año después de consultarlo con diferentes organizaciones. A partir de 2005 la responsabilidad de organizar el Día Mundial recae sobre una organización independiente, la Campaña Mundial contra el sida (*WAC, World AIDS Campaign*). Encontrarás más información y materiales en <http://www.worldaidscampaign.org>

### ¿Cuál es el lema del Día Mundial de Lucha contra el sida?

El lema de la campaña mundial contra el sida en 2001-2010 es "Detén el SIDA. Mantén la promesa" (*"Stop AIDS. Keep the Promise"*). Durante los años 2009 y 2010 la campaña se centra en promocionar los derechos de las personas a la salud y al acceso a los medicamentos y este año en concreto, se lleva a cabo la campaña [Light for rights](#).

Por otro lado, la Generalitat de Catalunya, a través del departamento de salud, cada año realiza un [comunicado oficial](#). Este 2010, el lema del Día Mundial de Lucha contra el Sida es "*Estima't. Fes-te la prova. Utilitza preservatiu*", (*Quiérete. Hazte la prueba. Utiliza el preservativo*) y su objetivo es promover el diagnóstico precoz del VIH y prevenir la infección.

### ¿Qué es el lazo rojo?

El lazo rojo es el símbolo utilizado en todo el mundo para expresar la solidaridad con los/as enfermos/as a causa del sida. El color rojo del lazo representa el vínculo entre la sangre y la pasión y se remonta a una tradición estadounidense de honrar y recordar a las personas muertas con una cinta atada a un árbol como símbolo de amor y afecto por la persona desaparecida. Nació el año 1991 cuando un grupo de artistas de Nueva York, "*Visual AIDS Artists Caucus*", buscaban un símbolo para expresar su solidaridad con las personas con VIH/sida.

### ¿Cuáles son las principales actividades que se desarrollan durante este día?

Cada país y cada entidad organizan las actividades que quiere englobadas dentro del lema internacional. En Cataluña el Comité 1 de diciembre organiza actos unitarios durante todo el día. Encontrarás más información en el siguiente [documento](#).

### ¿Cuáles son los principales datos epidemiológicos del VIH/sida?

El siguiente cuadro muestra los principales datos relacionados con el VIH/sida en Cataluña, España y el mundo (*datos actualizados a 24 de noviembre de 2010*). Para más información consulta los enlaces.

MUNDO <sup>1</sup>	ESPAÑA <sup>2</sup>	CATALUÑA <sup>3</sup>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 33'3 millones de <b>personas viven con el VIH</b></li> <li>■ 2,6 millones de <b>nuevas infecciones</b> ( incidencia mundial del VIH ) en el 2009, 20% menos que en 1999</li> <li>■ 1'8 millones de <b>muerres relacionadas</b> con el VIH/sida en el 2009, 20% menos que en 2004.</li> <li>■ La tasa de nuevas infecciones por el VIH se ha reducido más de un 25% en al menos 56 países entre 2001 y 2009.</li> <li>■ Sin embargo, en 7 países, la mayoría en Europa oriental y Asia central, las tasas han aumentado un 25%.</li> <li>■ Entre los jóvenes de los 15 países más afectados por la epidemia, la tasa de nuevas infecciones ha descendido más de un 25% debido a la adopción de prácticas sexuales más seguras.</li> <li>■ Aunque el número de nuevas infecciones es menor, por cada persona que inicia el tratamiento, dos contraen el virus.</li> <li>■ Las personas que viven con el VIH viven más tiempo y el número de defunciones relacionadas con el sida está descendiendo gracias a la ampliación del tratamiento.</li> <li>■ El número de personas que siguen tratamiento se ha multiplicado por 7'5 en los últimos 5 años. Solo en el último año accedieron al tratamiento un 30% más de personas respecto al 2008.</li> <li>■ Sin embargo, casi el doble de personas, 10 millones todavía están a la espera de recibir antirretrovíricos.</li> <li>■ El número de niños que nacen con el VIH ha disminuido un 24% respecto a cinco años antes.</li> <li>■ África Subsahariana acapara el 69% de todas las nuevas infecciones del mundo</li> <li>■ Europa Occidental y central cuenta con 820.000 personas infectadas y una prevalencia en adultos del 0'2%.</li> <li>■ En España no hay un registro de diagnósticos del VIH estatal. Onusida calcula que hay 130.000 infectados, de las que unas 32.000 serían mujeres (un ligero aumento respecto a los 120.000 de 2001).</li> </ul>	<p>Registro Nacional :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Al 2008 se diagnosticaron 1.340 <b>casos de sida</b>, un descenso del 80'1% respecto al 1996.</li> <li>■ Respecto al 2007, se ha producido un descenso del 16'6% en hombres y un 8'6% de mujeres.</li> <li>■ Notificación de 1.170 <b>casos diagnosticados VIH +</b> en 2008. De estos: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ El 77% de los diagnósticos son en hombres</li> <li>■ La edad media de los diagnósticos se mantiene a los 41 años.</li> <li>■ La proporción de casos pediátricos (menores de 13 años) se sitúa en el 0,4%.</li> </ul> </li> <li>■ <b>Transmisión:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ La transmisión sexual supone el 55'2% de los nuevos casos diagnosticados el 2008</li> <li>■ Un 34'9% de las personas contrajeron la infección por relaciones heterosexuales no protegidas y en números absolutos continua siendo más frecuente en hombres que en mujeres.</li> <li>■ Sin embargo, un 65'4% de las mujeres diagnosticadas de sida notificadas en 2008 son por relaciones heterosexuales no protegidas</li> <li>■ El 34'4% de las personas que han desarrollado el sida en 2008 contrajeron la infección por compartir material de inyección ( 37'6% hombres, 23'4% mujeres)</li> <li>■ La tercera vía de transmisión más frecuente son las relaciones sexuales entre hombres, que suponen el 20'3% de todos los casos y el 26'3% de los que afectan al total de hombres.</li> <li>■ . El 26'5% de los casos del 2008 son personas de origen extranjero. Un 41'3% provienen de Latinoamérica y el 33'9% de África</li> </ul> </li> <li>■ Des de el inicio de la epidemia a España se han notificado un <b>total</b> de 77.953 casos de sida.</li> <li>■ Se calcula que en España el 30% de las personas que tienen VIH <b>no lo saben</b></li> </ul>	<p>Des del 01/01/1981 hasta el día 30/06/2010 se han declarado en el registro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 16.430 <b>casos de sida</b> residentes a Cataluña.</li> <li>■ De estos, 13.214 son hombres ( 80'4%) y 3.216 son mujeres (19'6%)</li> </ul> <p>Des del 01/01/2001 hasta el día 30/06/2010 se han declarado en el registro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 6.134 <b>casos de VIH</b> residentes a Cataluña.</li> <li>■ De estos, 4.780 son hombres (77'9%) y 1.354 mujeres (22'1 %).</li> </ul> <p>El número de <b>muerres relacionadas con el VIH/sida</b> des del 01/01/1981 hasta al día 30/06/2010 ha sido:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 10.188 muerres, un 63'2% de hombres y un 57% de mujeres.</li> </ul> <p>Las principales vías de <b>transmisión</b> en el año 2009 son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 45'4% por relaciones heterosexuales, de las que el 73'7% son mujeres y el 37'5 hombres</li> <li>■ 27'6% por relaciones homo o bisexuales</li> <li>■ 17'8% por relaciones heterosexuales y usuarios de droga por vía parenteral (18'4% hombres, 15'8% mujeres)</li> </ul>

<sup>1</sup>Informe 2010 *Situación de la epidemia de sida* de [Onusida](#)

<sup>2</sup> [Registre Nacional de casos de sida](#), situación a 30 de junio de 2009. [Gràfics registre](#) Secretaria Nacional sobre Sida. [Infección VIH no diagnosticada: situación en España](#). Marzo 2009.

<sup>3</sup> Registre casos de sida i declaració de casos de VIH a Catalunya primer semestre 2010. [CEESCAT](#)