

## Cuadro de la situación actual del VIH/sida (actualización 24 de noviembre de 2010)

<b>MUNDO<sup>1</sup></b>	<b>ESPAÑA<sup>2</sup></b>	<b>CATALUÑA<sup>3</sup></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 33'3 millones de <b>personas viven con el VIH</b></li> <li>■ 2,6 millones de <b>nuevas infecciones</b> (incidencia mundial del VIH) en el 2009, 20% menos que en 1999</li> <li>■ 1'8 millones de <b>muerres relacionadas</b> con el VIH/sida en el 2009, 20% menos que en 2004.</li> <li>■ La <b>tasa de nuevas infecciones por el VIH</b> se ha reducido más de un 25% en al menos 56 países entre 2001 y 2009.</li> <li>■ Sin embargo, en 7 países, la mayoría en Europa oriental y Asia central, las tasas han aumentado un 25%.</li> <li>■ <b>Entre los jóvenes de los 15 países más afectados</b> por la epidemia, la tasa de nuevas infecciones ha descendido más de un 25% debido a la adopción de prácticas sexuales más seguras.</li> <li>■ Aunque el número de nuevas infecciones es menor, por cada persona que inicia el tratamiento, dos contraen el virus.</li> <li>■ Las personas que viven con el VIH viven más tiempo y el número de defunciones relacionadas con el sida está descendiendo gracias a la ampliación del tratamiento.</li> <li>■ El número de <b>personas que siguen tratamiento</b> se ha multiplicado por 7'5 en los últimos 5 años. Solo en el último año accedieron al tratamiento un 30% más de personas respecto al 2008.</li> <li>■ Sin embargo, casi el doble de personas, 10 millones todavía están a la espera de recibir antirretrovíricos.</li> <li>■ El número de <b>niños que nacen con el VIH</b> ha disminuido un 24% respecto a cinco años antes.</li> <li>■ <b>África Subsahariana</b> acapara el 69% de todas las nuevas infecciones del mundo</li> <li>■ <b>Europa Occidental y central</b> cuenta con 820.000 personas infectadas y una prevalencia en adultos del 0'2%.</li> <li>■ En <b>España</b> no hay un registro de diagnósticos del VIH estatal. Onusida calcula que hay 130.000 infectados, de las que unas 32.000 serían mujeres (un ligero aumento respecto a los 120.000 de 2001).</li> </ul>	<p>Registro Nacional :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Al 2008 se diagnosticaron 1.340 <b>casos de sida</b>, un descenso del 80'1% respecto al 1996.</li> <li>■ Respecto al 2007, se ha producido un descenso del 16'6% en hombres y un 8'6% de mujeres.</li> <li>■ Notificación de 1.170 <b>casos diagnosticados VIH +</b> en 2008. De estos: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ El 77% de los diagnósticos son en hombres</li> <li>■ La edad media de los diagnósticos se mantiene a los 41 años.</li> <li>■ La proporción de casos pediátricos (menores de 13 años) se sitúa en el 0,4%.</li> </ul> </li> <li>■ <b>Transmisión:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ La transmisión sexual supone el 55'2% de los nuevos casos diagnosticados el 2008</li> <li>■ Un 34'9% de las personas contrajeron la infección por relaciones heterosexuales no protegidas y en números absolutos continua siendo más frecuente en hombres que en mujeres.</li> <li>■ Sin embargo, un 65'4% de las mujeres diagnosticadas de sida notificadas en 2008 son por relaciones heterosexuales no protegidas</li> <li>■ El 34'4% de las personas que han desarrollado el sida en 2008 contrajeron la infección por compartir material de inyección ( 37'6% hombres, 23'4% mujeres)</li> <li>■ La tercera vía de transmisión más frecuente son las relaciones sexuales entre hombres, que suponen el 20'3% de todos los casos y el 26'3% de los que afectan al total de hombres.</li> <li>■ El 26'5% de los casos del 2008 son personas de origen extranjero. Un 41'3% provienen de Latinoamérica y el 33'9% de África</li> </ul> </li> <li>■ Des de el inicio de la epidemia a España se han notificado un <b>total</b> de 77.953 casos de sida.</li> <li>■ Se calcula que en España el 30% de las personas que tienen VIH <b>no lo saben</b></li> </ul>	<p>Des del 01/01/1981 hasta el día 30/06/2010 se han declarado en el registro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 16.430 <b>casos de sida</b> residentes a Cataluña.</li> <li>■ De estos, 13.214 son hombres ( 80'4%) y 3.216 son mujeres (19'6%)</li> </ul> <p>Des del 01/01/2001 hasta el día 30/06/2010 se han declarado en el registro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 6.134 <b>casos de VIH</b> residentes a Cataluña.</li> <li>■ De estos, 4.780 son hombres (77'9%) y 1.354 mujeres (22'1 %).</li> </ul> <p>El número de <b>muerres relacionadas con el VIH/sida</b> des del 01/01/1981 hasta al día 30/06/2010 ha sido:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 10.188 muerres, un 63'2% de hombres y un 57% de mujeres.</li> </ul> <p>Las principales vías de <b>transmisión</b> en el año 2009 son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 45'4% por relaciones heterosexuales, de las que el 73'7% son mujeres y el 37'5 hombres</li> <li>■ 27'6% por relaciones homo o bisexuales</li> <li>■ 17'8% por relaciones heterosexuales y usuarios de droga por vía parenteral (18'4% hombres, 15'8% mujeres)</li> </ul>

<sup>1</sup> Informe 2010. *Situación de la epidemia de sida* de Onusida

<sup>2</sup> [Registre Nacional de casos de sida](#), situación a 30 de junio de 2009. [Gráficos registre](#) Secretaria Nacional sobre Sida. [Infección VIH no diagnosticada: situación en España](#). Marzo 2009.

<sup>3</sup> Registre casos de sida i declaració de casos de VIH a Catalunya primer semestre 2010. [CEESCAT](#)