



Recursos para la evaluación en intervenciones comunitarias

Jóvenes

Información sobre el Contexto

Proyecto Evalúa+

**SIDA STUDI**



Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida


# Introducción

Actualmente, en España viven 7.893.808 de chicos y chicas entre 13 y 29 años según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) del 2010.

Según los datos publicados por ONUSIDA en 2009 la prevalencia de jóvenes por VIH a nivel global era del 0.6% en chicas y del 0.3% en chicos de entre 15 y 24 años.

# Número de Casos VIH

## Nuevos diagnósticos VIH entre 15 y 30 años (2005 -2009)




Los datos son de 15 Comunidades Autónomas: (Baleares, Canarias, Cataluña, Ceuta, Extremadura, Navarra, País Vasco, La rioja, Galicia, Asturias, Madrid, Aragón, Melilla, Castilla y León, Cantabria)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Salud Carlos III. Centro Nacional de Epidemiología

# Número de casos Sida

## Casos sida en jóvenes de entre 15 y 30 años (2005-2010)




Los casos están descritos hasta **30 de junio de 2010**.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Salud Carlos III. Centro Nacional de Epidemiología

# Número de casos Sida II

Casos sida acumulados desde 1981 - 2010 por colectivo



UDIs: usuarios/as de drogas inyectadas; HSH: Hombres que tienen sexo con hombres; Jóvenes: límite de edad 34 años.

Los casos están descritos hasta **30 de junio de 2010**.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Salud Carlos III. Centro Nacional de Epidemiología

## **Mortalidad casos Sida**

**Según datos de la SPNS en 2008 fallecieron 38 jóvenes entre 15 y 30 años (28 chicos y 10 chicas) por VIH/sida.**

# Información sobre ITS

Según datos del Grupo de Trabajo de ITS entre 2005 — 2007 se diagnosticaron 567 casos de sífilis y 842 de gonococia en jóvenes de 7 CC.AA.

\* Los datos del grupo de Trabajo de ITS pertenecen a 14 centros hospitalarios de Andalucía, Asturias, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia y País Vasco.

# Relaciones sexuales y prácticas sexuales

## Relaciones Sexuales entre jóvenes de 15 -19 años (%)

Chicos		Chicas	
Año 2005	Año 2009	Año 2005	Año 2009
55.8	67.1	52.8	65.7

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Bayer Schering (2009).



# Uso preservativo y métodos preventivos

## Métodos preventivos utilizados por los/las jóvenes en 2009 (%)

	15 – 19 años	20 – 24 años	25 – 29 años
Preservativo	47.1	49.5	38.8
Píldora	11.3	27	30,5
Otros (anillos, parches, ...)	3.2	7.1	9.2
Ninguno	35.5	10	13.8

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Encuesta DAPHNE

# Uso preservativo y métodos preventivos II

## Frecuencia del uso del preservativo en los últimos 6 meses en 2008 (%)

	Chicos		Chicas	
	Pareja Afectiva	Pareja Ocasional	Pareja Afectiva	Pareja Ocasional
<b>Penetración Vaginal</b>				
Nunca	24.1	10.2	26.3	3.5
A veces	22.8	18.2	20.6	24.6
Siempre	53.1	71.6	53.1	71.9
<b>Penetración Anal</b>				
Nunca	49.1	28.6	57.1	20
A veces	20	26.2	14.3	60
Siempre	30.9	45.2	28.6	20
<b>Sexo Oral</b>				
Nunca	80.1	56.5	83.8	78.9
A veces	11.1	20.4	7.1	21.1
Siempre	8.8	23.1	9.1	0

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Instituto de Salud Carlos III. Centro Nacional de Epidemiología

## **Uso preservativo y métodos preventivos II**

**Según el Informe INJUVE del 2008, un 77.6% de los/las jóvenes entre 15 y 29 años utilizaron el preservativo en su última relación sexual y un 55.8% usó siempre el preservativo durante el último año.**

## Tratamiento Postcoital

Las fuentes consultadas y los criterios establecidos no han permitido incluir datos específicos en esta sección.

# Embarazo no deseado


## Embarazo no deseado en función de la edad (%)

	Total	15-17 años	18 -20 años	21 – 24 años	25 – 29 años
Si	12.1	5.8	6	13	15.2
No	86.5	92.2	92.5	85.3	83.9
No Contesta	1,4	2	1.5	1,7	0.9

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de IJE-2004. Año 2004

# Interrupción voluntaria del embarazo


Número de IVE en menores de 15 años (2005 – 2008)



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Ministerio de Sanidad y Consumo

# Interrupción voluntaria del embarazo II

## Número de IVE en jóvenes entre 15 y 19 años (2005 – 2008)



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Ministerio de Sanidad y Consumo

# Interrupción voluntaria del embarazo III

## Número de Interrupciones voluntarias del embarazo entre los 15 y 44 años

2003	2004	2005	2006	2007	2008
79.788	84.985	75.500	83.342	92.370	115.812

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Encuesta Daphne, 2007



## Prueba del VIH

Las fuentes consultadas y los criterios establecidos no han permitido incluir datos específicos en esta sección.

# Coinfección

Las fuentes consultadas y los criterios establecidos no han permitido incluir datos específicos en esta sección.

# Conclusiones

- El número de nuevos diagnósticos entre la población joven se mantiene estable.
- Se puede observar un descenso continuado respecto a los/las jóvenes que pasan a estado sida.
- Se inician antes en las relaciones sexuales.

## Conclusiones II

■ El método preventivo más utilizado es el preservativo pero sigue siendo insuficiente, siendo los/las chicos y chicas de 15 a 19 años lo que menos protección usan en sus RS.

■ El número de interrupciones voluntarias del embarazo es muy elevado, poniendo de manifiesto el poco uso de métodos preventivos en sus RS.

**+ Info**

**MONOGRÁFICO Jóvenes**