



**Recursos para la evaluación en intervenciones comunitarias**

**Mujeres**

## **Información sobre el Contexto**

**Proyecto Evalúa+**

**SIDA STUDI**



Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida


# Introducción

Actualmente, en España viven 23.756.028 mujeres según los datos del padrón publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) del 2010.

Según ONUSIDA (2009) se estima que hay alrededor de 15.900.000 mujeres que viven con el VIH.

# Número de Casos VIH

## Nuevos diagnósticos VIH (2005 -2009)




Los datos son de 15 Comunidades Autónomas: (Baleares, Canarias, Cataluña, Ceuta, Extremadura, Navarra, País Vasco, La rioja, Galicia, Asturias, Madrid, Aragón, Melilla, Castilla y León, Cantabria)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Salud Carlos III.  
Centro Nacional de Epidemiología

# Número de casos Sida

Casos sida (2005-2010)




Los casos están descritos hasta **30 de junio de 2010**.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Salud Carlos III. Centro Nacional de Epidemiología

# Número de casos Sida II

Casos sida acumulados desde 1981 - 2010 por colectivo



UDIs: usuarios/as de drogas inyectadas; HSH: Hombres que tienen sexo con hombres; Jóvenes: límite de edad 34 años.

Los casos están descritos hasta **30 de junio de 2010**.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Salud Carlos III. Centro Nacional de Epidemiología

## Mortalidad casos Sida

Según datos de la SPNS en 2008 fallecieron 1.215 personas por VIH/sida (950 hombres y 265 mujeres).


# Información sobre ITS

Según datos del Grupo de Trabajo de ITS entre 2005 – 2007 se diagnosticaron 185 casos de sífilis y 215 de gonococia en mujeres de 7 CC.AA.

\* Los datos del grupo de Trabajo de ITS pertenecen a 14 centros hospitalarios de Andalucía, Asturias, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia y País Vasco.

# Relaciones sexuales y prácticas sexuales


Edad Inicio Relaciones Sexuales en 2003 (%)



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Salud Sexual del 2006

# Relaciones sexuales y prácticas sexuales II


## Edad Inicio Relaciones Sexuales en 2009 (%)



Fuente: Encuesta Nacional de Salud Sexual del 2009

# Relaciones sexuales y prácticas sexuales III


Personas que iniciaron las RS antes de los 16 años en 2003 (%)



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Salud Sexual del 2006

# Uso preservativo y métodos preventivos


Personas que utilizaron el preservativo en la primera RS en 2003 (%)



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Salud Sexual del 2006

# Uso preservativo y métodos preventivos II


Personas que utilizaron el preservativo en la última RS en 2003 (%)



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Salud Sexual del 2006

# Uso preservativo y métodos preventivos III


% Personas que utilizaron algún método preventivo para ITS y VIH (2009)



Fuente: Encuesta Nacional de Salud Sexual del 2009

# Uso preservativo y métodos preventivos IV

## % Uso método preventivo más frecuente (2009)



Fuente: Encuesta Nacional de Salud Sexual del 2009

# Uso preservativo y métodos preventivos V

	1997	1999	2001	2003	2007	2009
<b>Preservativo</b>	21,0%	21,9%	29,5%	31,9%	38,8%	37,3%
<b>Píldora</b>	14,3%	16,5%	19,2%	18,3%	20,3%	17,9%
<b>Doble Método</b>	—	—	—	—	0,4%	1,5%
<b>DIU</b>	5,7%	5,9%	4,7%	4,6%	4,5%	4,9%
<b>Pareja Vasectomizada</b>		6,4%	6,5%	6,8%	4,3%	4,6%
<b>Ligadura de Trompas</b>	5,2%	4,5%	5,3%	5,3%	4,1%	4,3%
<b>Otros (Anillo, Parche,Impl,...)</b>	0,5%	0,5%	0,7%	1,1%	4,5%	5,7%
<b>Coito Interrupto</b>	1,5%	4,3%	2,6%	2,9%	2,5%	2,2%
<b>Método Ogino o Naturales</b>	0,9%	0,7%	0,6%	0,3%	0,5%	0,6%
<b>Ninguno</b>	50,9%	39,3%	30,9%	28,8%	20,1%	21,0%
<b>Total</b>	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: Encuesta Daphne, 2007

# **Interrupción voluntaria del embarazo**


**Número de Interrupciones voluntarias del embarazo entre los 15 y 44 años**

2003	2004	2005	2006	2007	2008
79.788	84.985	75.500	83.342	92.370	115.812

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Encuesta Daphne, 2007

# Prueba del VIH

Personas que se han realizado la prueba entre 1998 – 2003 (%)



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Salud Sexual del 2003

## Coinfección

Las fuentes consultadas y los criterios establecidos no han permitido incluir datos específicos en esta sección.

# Conclusiones

- El número de nuevos diagnósticos se mantiene sin cambios.
- Hay un descenso constante y continuado del número de casos Sida.
- El uso del preservativo es mayor en la población joven.

## Conclusiones II

- El uso del preservativo cada vez es mayor, pero las cifras siguen siendo insuficientes.
- El número de Interrupciones voluntarias del embarazo aumenta cada año, por tanto, no se utilizó ningún método preventivo.
- Las mujeres se realizan menos la prueba del VIH que los hombres.

+ Info

# MONOGRÁFICO Mujeres