



Recursos para la evaluación en intervenciones comunitarias

Población general

Información sobre el Contexto

Proyecto Evalúa+

SIDA STUDI



Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida


Introducción

Actualmente, en España viven 47.021.031 de personas según los datos del padrón publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) del 2010.

Según ONUSIDA (2009), 130.000 personas viven con el VIH en nuestro país, de las cuáles se considera que un 30% desconocen su estado serológico.

Número de Casos VIH

Nuevos diagnósticos VIH (2005 -2009)




Los datos son de 15 Comunidades Autónomas: (Baleares, Canarias, Cataluña, Ceuta, Extremadura, Navarra, País Vasco, La rioja, Galicia, Asturias, Madrid, Aragón, Melilla, Castilla y León, Cantabria)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Salud Carlos III. Centro Nacional de Epidemiología

Número de casos Sida

Casos sida Totales (2005-2010)




Los casos están descritos hasta **30 de junio de 2010**.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Salud Carlos III.
Centro Nacional de Epidemiología

Número de casos Sida II

Casos sida acumulados desde 1981 - 2010 por colectivo



UDIs: usuarios/as de drogas inyectadas; HSH: Hombres que tienen sexo con hombres; Jóvenes: límite de edad 34 años.

Los casos están descritos hasta **30 de junio de 2010**.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Salud Carlos III. Centro Nacional de Epidemiología

Mortalidad casos Sida


Según datos de la SPNS en 2008 fallecieron 1.215 personas por VIH/sida (950 hombres y 265 mujeres).

Desde el inicio de la pandemia en 1981 se han producido 52.147 fallecimientos por VIH/sida.

Hasta 1996 fueron en aumento, pero con los nuevos ARV se ha conseguido que el número de muertes descienda cada año.

Información sobre ITS

Casos nuevas Infección por Sífilis (2005 -2009)




Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Instituto de Salud Carlos III. Centro Nacional de Epidemiología.

Datos recogidos por el EDO (Sistema de Enfermedades de Declaración Obligatoria) de todo el Estado.

Información sobre ITS II


Casos nuevas Infección Gonococia (2005-2009)



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Instituto de Salud Carlos III. Centro Nacional de Epidemiología.
Datos recogidos por el EDO (Sistema de Enfermedades de Declaración Obligatoria) de todo el Estado.

Relaciones sexuales y prácticas sexuales


Edad Inicio Relaciones Sexuales en 2003 (%)



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Salud Sexual del 2006

Relaciones sexuales y prácticas sexuales II


Edad Inicio Relaciones Sexuales en 2009 (%)



Fuente: Encuesta Nacional de Salud Sexual del 2009

Relaciones sexuales y prácticas sexuales III


Personas que iniciaron las RS antes de los 16 años en 2003 (%)



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Salud Sexual del 2006

Uso preservativo y métodos preventivos


Personas que utilizaron el preservativo en la primera RS en 2003 (%)



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Salud Sexual del 2006

Uso preservativo y métodos preventivos II


Personas que utilizaron el preservativo en la última RS en 2003 (%)



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Salud Sexual del 2006

Uso preservativo y métodos preventivos III


% Personas que utilizaron algún método preventivo para ITS y VIH (2009)



Fuente: Encuesta Nacional de Salud Sexual del 2009

Uso preservativo y métodos preventivos IV


% Uso método preventivo más frecuente (2009)



Fuente: Encuesta Nacional de Salud Sexual del 2009

Prueba del VIH

Personas que se han realizado la prueba entre 1998 – 2003 (%)



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Salud Sexual del 2003

Prueba del VIH II

Según los datos publicados por el ICAP, en 2008 se realizaron 1.185.621 de pruebas del VIH entre hombres y mujeres de 15 a 49 años en 15 CC.AA.

Coinfección

En España, hay pocos estudios sobre prevalencia de la infección por hepatitis en pacientes VIH+, y los existentes no son de ámbito nacional.

Conclusiones I

- El número de nuevas infecciones ha aumentado ligeramente en los últimos años, aunque se mantiene bastante estable.
- El número de casos sida sigue disminuyendo ligeramente en los últimos años, gracias a los ARV.
- Respecto a las ITS (sífilis y gonococia), muestran un ligero aumento en los últimos años
- Cada vez se inician antes las RS.

Conclusiones II

- Los jóvenes están más concienciados en el uso del preservativo y tienen a utilizarlo en sus primeras RS tanto chicas como chicos.
- Los jóvenes utilizan más el preservativo, pero igualmente el porcentaje de uso es insuficiente.
- La población general, se ha realizado poco la prueba del VIH, en especial las mujeres.

+ Info

MONOGRÁFICO Población general