

TRABAJADORES DEL SEXO TRANSEXUALES Y MASCULINOS: COLECTIVOS DE ALTO RIESGO PARA EL VIH Y OTRAS ITS

M. Vera, M. Villa, M. Chamón, J.A. Pérez, T. Puerta, J. Ballesteros, P. Clavo, C. Rodríguez, I. Zaro, J. Del Romero. Centro Sanitario Sandoval, Dirección Asistencial Centro. Comunidad de Madrid. Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos (IdISSC). Imagina

OBJETIVOS

- Describir las características sociodemográficas, clínicas y conductuales (hábitos tóxicos y prácticas sexuales) de los hombres (HEP) y transexuales (TEP) que ejercen la prostitución diagnosticados de infección por el VIH en el Centro Sanitario Sandoval.

MATERIAL Y MÉTODOS

- Estudio descriptivo transversal observacional. Se incluyeron todos los trabajadores del sexo diagnosticados de infección por el VIH entre los años 2007 y 2012 en el Centro Sandoval en Madrid.
- Se pasó un cuestionario epidemiológico estructurado con objeto de identificar prácticas sexuales de riesgo y hábitos tóxicos.
- Se realizó un cribado de otras ITS en función de las prácticas sexuales desprotegidas y estudio de la situación clínica respecto al VIH (CD4, carga viral).

RESULTADOS

De las 657 serologías realizadas en trabajadores del sexo (476 HEP y 181 TEP), 128 resultaron positivas, un 82% HEP (105) y un 18% TEP (23).

- **72%** tenían entre 22 y 31 años, con una mediana de edad al diagnóstico de 28 años.
- Un **82%** procedían de Latinoamérica y el **85%** tenían estudios primarios o secundarios.
- El **91%** refería haber tenido más de cien parejas sexuales en el último año y un **87%** más de mil a lo largo de su vida.
- Un **68%** tuvo su primera relación sexual antes de los 15 años.
- El **86%** declaró consumir drogas no inyectadas.


Pruebas previas negativas N=128

Con pruebas previas negativas	85%
-------------------------------	-----

Antecedente ITS/ITS concomitante al VIH N=128

Antecedente ITS	69%
ITS concomitante	49%

Nivel de CD4 al diagnóstico de infección por el VIH en el Centro Sanitario Sandoval



ESTADÍO AL DIAGNÓSTICO DE INFECCIÓN POR EL VIH

Enfermedad avanzada (CD4 <200 cels/μl): 4%

Estadio precoz (CD4 >350 cels/μl): 83%

CONCLUSIONES

- Se observa una elevada incidencia del VIH y otras ITS en los trabajadores del sexo, masculinos y transexuales, especialmente entre las transexuales latinoamericanas.
- Estos datos alertan sobre la prioridad de establecer **programas preventivos específicos** dirigidos a este colectivo y la necesidad de colaboración de las clínicas de ITS con las ONG que trabajan en el ámbito de la prostitución masculina y transexual para reducir el retraso en el diagnóstico de la infección por el VIH.