

## Situación de los adolescentes y jóvenes con VIH en la Argentina

Entre 2003 y 2013 se notificaron 12.926 casos de VIH en menores de 24 años. De estos, 1.956 (15%) se produjeron en menores de 14 años, 2.505 (20%) en adolescentes de 15 a 19 años y 8.465 (65%) en jóvenes de 20 a 24 años (Gráfico 42). Estos números nos señalan la necesidad de profundizar en el conocimiento de este sector de la población, a fin de recomendar acciones específicas para reducir el riesgo de transmisión en esta franja etaria.

Para el análisis de las variables que presentamos en este artículo hemos considerado la población de 20 a 24 años e inferimos que una proporción contrajo la infección durante la adolescencia. El análisis proporcional de la distribución de casos según el año de diagnóstico muestra que sólo se ha producido un descenso significativo en el grupo de menores de 14 años –el cual pasó de representar el 25% de los diagnósticos notificados en personas de 0 a 24 años en 2003 al 11% en 2013 (véase el descenso de las tasas en el Gráfico 8 de la página 19).


Al analizar la tendencia de diagnósticos según sexo en adolescentes y jóvenes (Gráfico 43), se observa que los diagnósticos en la población femenina de 15 a 19 años superaron a los de la población masculina durante todo el período. En el grupo de 20 a 24 años, en cambio, se observa a partir de 2005 un predominio de la población masculina. Antes de ese año también prevalecían las mujeres en este subgrupo de edad. Vale señalar que el descenso en los diagnósticos durante los últimos dos años debe ser interpretado con reservas, debido al retraso en las notificaciones.

Las relaciones sexuales desprotegidas fueron la vía de transmisión predominante en el último quinquenio. Esto puede observarse tanto en los varones como en las mujeres de 15 a 24 años, alcanzando al 95% de las mujeres y al


92% de los varones (Gráfico 44 de la página siguiente). En la población de varones, las relaciones sexuales con otros varones fueron la vía de transmisión más frecuente para ambos grupos etarios. En el trienio 2011-2013 no se han registrado en estos grupos diagnósticos de personas infectadas por uso compartido de material para el consumo de drogas inyectables.

Para el análisis del nivel de instrucción sólo se consideró a la población mayor de 19 años. En el Gráfico 45 (en la página siguiente) se presenta la información según sexo y vía de transmisión sexual. Es muy poca la diferencia en la escolaridad de varones y mujeres infectados durante relaciones heterosexuales, en tanto que los varones infectados por relaciones desprotegidas con otros varones

**Gráfico 42. Distribución de la población de menores de 24 años con VIH según grupo etario y año de diagnóstico, Argentina (2003-2013)**



**Gráfico 43. Tendencia de los diagnósticos de VIH en varones y mujeres de 15 a 24 años según grupo etario y año de diagnóstico, Argentina (2003-2013)**



tienen mayor nivel de instrucción. En el período 2011-2013, entre las personas infectadas por relaciones heterosexuales, sólo el 38% de los varones y el 35% de las mujeres habían completado o superado la escuela secundaria al momento del diagnóstico de VIH, en tanto que el

69% de los varones infectados por relaciones homosexuales sí había alcanzado ese nivel. En todos los grupos se aprecia un aumento de la escolaridad, lo cual podría estar vinculado con el incremento registrado en el conjunto de la población Argentina durante la última década.


## Oportunidad del diagnóstico de VIH

Hasta 2011 el diagnóstico tardío fue definido en el boletín epidemiológico de la DSyETS por la presencia de un evento definidor de sida al momento del diagnóstico de VIH o dentro de los 12 meses siguientes. De acuerdo con esta definición, durante el período 2009-2011 se diagnosticaron en etapas avanzadas de la infección el 8,9% de los varones y el 2,3% de las mujeres, ambos de entre 15 y 19 años, y el 10,8% de los varones y el 4,8% de las mujeres de 20 a 24 años. En el Gráfico 46 (de la página siguiente) se observa la tendencia a lo largo de la última década por sexo y grupo de edad.


Desde 2012 se incluye en la ficha de notificación el estadio clínico al momento del diagnóstico. Esto permitió sensibilizar la detección de diagnósticos tardíos dado que esta definición incluye no sólo a las personas con sida sino a aquellas con eventos sintomáticos no definidores de sida aunque vinculados a un deterioro inmunológico. De acuerdo con esta definición se diagnosticaron en forma tardía el 15,8% de los varones y el 4,8% de las mujeres de 15 a 19 años ( $p = 0,003$ ) y el 12,7% de los varones y el 4,7% de las mujeres de 20 a 24 años ( $p = 0,00015$ ) (Tabla 5 en la página siguiente).

Dentro de la población de varones, a diferencia de lo que ocurre en adultos mayores de 24 años, el análisis del momento del diagnóstico según vía de transmisión no demostró en este último período diferencias estadísticamente significativas entre transmisión por relaciones heterosexuales u homosexuales en ninguno de los dos grupos etarios (Gráfico 47 en la página siguiente).

**Gráfico 44. Vía de transmisión en varones con VIH de 15 a 24 años, Argentina (2005-2013)**



**Gráfico 45. Distribución de la población de 19 a 24 años con VIH según sexo, vía de transmisión y máximo nivel de instrucción formal, Argentina (2005-2013)**



## Consideraciones finales

- Entre 2003 y 2013 se notificaron 12.926 menores de 24 años con VIH

en Argentina de los cuales 1.956 (15%) correspondieron a niños y niñas menores de 15 años infectados fundamentalmente por transmisión vertical y 2.505 (20%) a adolescentes de entre 15 y 19 años, infectados, fundamentalmente, por transmisión sexual.

- El único grupo con descenso significativo en el número de casos entre 2003 y 2013 fue el de menores de 14 años debido al impacto de las estrategias implementadas para la prevención de la transmisión vertical.
- El predominio durante todo el período del diagnóstico en la población femenina de 15 a 19 años es atribuible a la universalización de la oferta de testeo durante el embarazo.
- Las relaciones sexuales desprotegidas fueron la vía de transmisión más frecuente tanto en mujeres como en varones. En la población de varones predominó la transmisión a través de relaciones sexuales entre varones.
- El 41% de los varones y el 51% de las mujeres de 19 a 24 años no habían completado el secundario al momento del diagnóstico de VIH.

- El diagnóstico tardío en la población de adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años, pese a ser menos frecuente que en la de adultos mayores de 25 años, continúa siendo significativamente mayor en varones que en mujeres. Sin embargo, a diferencia de la población adulta masculina, no se detectan diferencias entre varones infectados por vía hétero u homosexual.
- El predominio del diagnóstico temprano podría estar reflejando un mayor impacto de las estrategias de promoción del testeo en esta población. ■

**Gráfico 46. Proporción de diagnósticos tardíos de VIH en la población de 15 a 24 años según sexo y año del diagnóstico, Argentina (2003-2011)**



**Tabla 5. Estadio clínico al momento del diagnóstico de VIH según sexo y edad, Argentina (2012-2013)**

	15 - 19 años		20 - 24 años	
	Varón	Mujer	Varón	Mujer
Síndrome retroviral agudo	4,7%	4,0%	3,4%	2,0%
Infección asintomática	67,3%	79,2%	73,7%	86,6%
Infección sintomática sin criterio de sida	12,1%	2,4%	5,7%	2,7%
Sida	3,7%	2,4%	7,0%	2,0%
Desconocido	12,2%	12,0%	10,2%	6,7%
<b>Total</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
	<b>107</b>	<b>125</b>	<b>596</b>	<b>299</b>

**Gráfico 47. Proporción de diagnósticos tardíos de VIH en varones de 15 a 19 y de 20 a 24 años según vía de transmisión sexual, Argentina (2012-2013)**

