

## LA COOPERACIÓN ENTRE EL SISTEMA SANITARIO Y LAS ONG LOGRA REDUCIR EL DIAGNÓSTICO TARDÍO DE LA INFECCIÓN POR EL VIH, EN MADRID

Vera-García M<sup>1</sup>, Rodríguez-Martín C<sup>1</sup>, Ayerdi-Aguirrebengoa O<sup>2</sup>; Pérez García J<sup>3</sup>, Puerta-López T<sup>1</sup>; Raposo-Utrilla M<sup>1</sup>; Del Romero-Guerrero J<sup>1</sup>. 1. Centro Sanitario Sandoval IdISSC, Madrid. 2. Hospital Fundación Jiménez Díaz, Madrid. 3. Hospital Virgen de La Luz, Cuenca.

### Objetivos:

- ❑ Determinar la situación inmunológica de los pacientes diagnosticados de infección por el VIH entre 2007 y 2012, algunos procedentes de ONGs de Madrid, y describir el perfil de los diagnosticados tardíamente.
- ❑ Describir el perfil de los diagnosticados tardíamente.

### Métodos:


Estudio analítico y descriptivo de los paciente que presentaron retraso en el diagnóstico del VIH, en una clínica de infecciones de transmisión sexual (ITS) de Madrid. A los pacientes se les pasó un cuestionario epidemiológico estructurado.

### Resultados:

Entre 2007 y 2012 se diagnosticaron del VIH 1.629 pacientes. A 1.373 se le pudo realizar la primera determinación de linfocitos T CD4+.

La tasa de **diagnóstico precoz** fue del **78%** y de **enfermedad avanzada** del **6,7%**.

### El diagnóstico tardío fue más frecuente en pacientes:



### El diagnóstico tardío fue menos frecuente en pacientes:

- que ejercían prostitución (18,1%)
- con síndrome retroviral agudo (9,6%)
- con otras ITS concomitantes al VIH (19,9%)

### El diagnóstico tardío fue menos frecuente en pacientes:

- con PPE previa (13,3%)
- que consumían drogas recreativas (19,7%)
- con virus con mutaciones genotípicas de resistencia a ARV (17,2%)

### Conclusiones:

Las clínicas de ITS, en colaboración con las ONGs, son dispositivos asistenciales que facilitan el diagnóstico precoz de la infección por el VIH.

Se detectan diferentes colectivos con mayor riesgo de DT, que deberían ser diana para la creación de programas preventivos específicos.