

# TASAS DE SEROCONVERSIÓN AL VHC, SEGÚN VIH, EN UNA CLÍNICA DE ITS EN MADRID

Carmen Rodríguez (1), Teresa Puerta (1), Mar Vera (1), Petunia Clavo (1), Juan Ballesterero (1), Oskar Ayerdi (1), Erika Lozano (2), Almudena Lillo (1), Montserrat Raposo (1), Jorge Del Romero (1).  
(1)Centro Sanitario Sandoval. IdISSC, (2)Hospital del Henares

## Antecedentes

A pesar de los grandes avances en la eficacia del tratamiento de la hepatitis C, se siguen observando nuevas infecciones, sobre todo en personas infectadas por el VIH. En los países con terapia antirretroviral disponible, la mortalidad por el VHC supera a la producida por el VIH y por el VHB.

## Objetivo


○ Evaluar la incidencia de nuevas infecciones por el VHC en personas inicialmente seronegativas, en función de su orientación sexual y su situación serológica respecto al VIH.

## Material y Métodos

- El estudio se realizó en una clínica de referencia sobre las ITS en Madrid.
- Se incluyeron a todas las personas seronegativas al VHC que fueron nuevamente analizadas para este virus, entre los años 2010-2015.
- A todos los pacientes seronegativos al VHC se les realizó anualmente, una nueva serología.
- Todos los sujetos analizados respondieron a un cuestionario epidemiológico estructurado con objeto de conocer variables sociodemográficas y su orientación sexual.

## Resultados

N=4.032 personas inicialmente seronegativas al VHC




□ Hombres    ■ Mujeres    ■ Transexuales

✓ Entre las 4.032 personas reanalizadas para el VHC, en 55 (1,4%) se produjo la seroconversión a este virus.

**Todos los seroconvertidores eran HSH**

- ✓ 3.432 (85,1%): eran hombres que tenían sexo con hombres (HSH),
- ✓ 600 (14,2%): heterosexuales.
- ✓ La edad media: 34 años (16-81 años).

**Tasa de seroconversión del VHC, según VIH**  
N= 55/4032 (1,4%)



## Conclusiones

- La hepatitis C es una infección emergente entre los HSH infectados por el VIH.
- Es recomendable la realización periódica de la serología del VHC a los pacientes infectados por el VIH, especialmente a los HSH y la del VIH a los individuos con infección por el VHC.
- Es conveniente identificar las prácticas de riesgo para la transmisión sexual o no sexual del VHC (chemsex, slam ...)
- con objeto de establecer un consejo preventivo personalizado.