

# Mortalidad por sida en Argentina

Este artículo fue elaborado con información provista por la Dirección de Estadística e Información de la Salud (DEIS) del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación.


La tasa de mortalidad por sida –el cociente entre el número de defunciones cuya causa básica es el sida, sobre la población en un período y lugar determinado- se mantiene estable a lo largo de la última década, solo mostrando ligeras oscilaciones. Cabe recordar que la mortalidad por sida no incluye a las personas con VIH que murieron por causas no relacionadas con la infección. En 2016, último año cerrado, se reportaron 1.494 muertes por esta causa, lo que produce una tasa de mortalidad de 3,4 x 100.000 habitantes; 4,71 entre los varones y 2,13 entre las mujeres.

En el **Gráfico 37** se presenta la evolución de las tasas, pero esta vez ajustadas. Allí se observa que la tasa correspondiente a los varones sigue duplicando la de las mujeres. En el caso de estas últimas, se evidencia un leve aumento entre 2011 y 2014, cuando comenzó a descender nuevamente. En el caso de los varones, los valores fluctúan algunas décimas de año a año. Recuérdese que el sistema estadístico nacional no diferencia varones y mujeres cis de personas trans. Las regiones con tasas más altas son el AMBA, con 4,4 por 100.000 habitantes,

seguidas del NOA, con 3,9; mientras que las tasas más bajas se presentan en NEA, con 2,2; el área central del país (sin incluir AMBA), con 2,7 y Cuyo, con 2,8 por 100.000 habitantes (**Gráfico 38**). La evolución de las tasas por sexo y provincia son heterogéneas; en la mayoría no se observan cambios, pero en algunas se aprecia una tendencia al aumento. Esto ocurre en particular en varias jurisdicciones del NEA, NOA y Cuyo, así como en la ciudad de Buenos Aires y en Córdoba (**ver Tabla 26 del Anexo**). Las tasas específicas por edad no mues-


tran cambios en las tendencias, salvo en el caso de los grupos de 15 a 44 años. En el caso de los varones, es estable en el de 0-14 años; desciende en los grupos de 25-34 y 35-44 y aumenta entre los de 15-24 y en los de mayor edad. Entre las mujeres, es estable entre las de 0-24 años y entre las de 35-44, desciende entre las de 25-34 y aumenta en las de mayor edad. Para el 2016, las tasas más elevadas se encuentran en los varones de 45-54 años (11,88 x 100.000) y entre las mujeres de 35-44 años (5,97) (**Gráfico 39**).

**Gráfico 37** Tasas brutas de mortalidad por sida por 100.000 habitantes según sexo, Argentina (2005-2016)




**FUENTE:** Elaboración propia en base a datos aportados por la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social.

**Gráfico 38** Tasa de mortalidad por sida por 100.000 habitantes según región, Argentina (2016)



**FUENTE:** Elaboración propia en base a datos aportados por la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social.

**Gráfico 39** Tasas de mortalidad por sida específicas según edad y sexo por 100.000 habitantes, Argentina (2005-2016)



**FUENTE:** Elaboración propia en base a datos aportados por la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social.