

CONSUMO DE DROGAS RECREATIVAS E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL ENTRE LOS SEROCONVERTORES RECIENTES AL VIH

Autores: Oskar Ayerdi, Mar Vera, Teresa Puerta, Juan Ballesteros, Petunia Clavo, Blanca Menéndez, Mónica García, Juan Carlos Carrió, Inmaculada Mozo, Montserrat Raposo, Carmen Rodríguez, Jorge Del Romero. Centros Centro Sanitario Sandoval IdISSC, Madrid

Palabras clave: Infecciones de transmisión sexual, VIH, Drogas

Objetivo: Evaluar la incidencia de infecciones de transmisión sexual (ITS) y la frecuencia del consumo de drogas recreativas entre los seroconvertedores recientes (SCVr) al VIH.

Metodología: Estudio descriptivo de los pacientes con SCVr al VIH entre 2014-2016 en una clínica monográfica de ITS de Madrid. A todos los pacientes se les pasó un cuestionario estructurado sobre características sociodemográficas, conductuales y clínicas. También, se les efectuó un despistaje de otras ITS en función de sus prácticas sexuales.



Resultados

Entre 2014-2016 → 857 Nuevos Dx de VIH

100%
Vía Sexual


SCVr: Persona diagnosticada del VIH con serología negativa documentada en los 12 meses previos (±6 m)

18,9% SCVr (n=162)




Ejercían prostitución el 6,3% de los HSH y una de las tres mujeres.


El 75,9% (n=123) de los SCVr 2014-2016 tenía Antecedentes de ITS




El 51,2% (n=83) de los SCVr presentó una ITS concomitante al diagnóstico del VIH. 2014-2016



El 87,7% (n=142) de los SCVr consume drogas recreativas



El 73,5% (n=119) de los SCVr mantuvo prácticas sexuales no protegidas bajo el efecto de drogas (PSNP). 2014-2016



Asociación entre prácticas sexuales no protegidas bajo el efecto de drogas recreativas y las ITS.

	PSNP bajo el efecto de drogas recreativas (n=119)	NO PSNP bajo el efecto de drogas recreativas (n=43)
Antecedentes de ITS	81,5% ↑	60,5%
ITS Concomitante	54,65%	41,9%

Conclusiones: Las ITS concomitantes y el consumo de drogas recreativas son muy frecuentes en entre los SCVr al VIH. Además, el consumo de drogas recreativas se asoció a un mayor número de episodios de ITS. Identificar estos marcadores de riesgo entre las personas seronegativas es fundamental para proponer herramientas preventivas adicionales, como la PrEP, con el fin de reducir la incidencia de nuevas infecciones por el VIH.