

97,1%

Probabilitat de supervivència més enllà dels 5 anys des de l'inici de tractament en els nous diagnòstics del VIH que no presenten un retard del diagnòstic

32.429

Persones vivint amb el VIH a Catalunya

531

Nous diagnòstics per VIH (+15 anys)

- Homo/bisexual
- Homes heterosexuales
- PID
- Desconegut

0,42%

Prevalença de VIH en relació a la població general

+30%

93,5

72

Taxa de casos de clamídia genital per 100.000 habitants

-10%

3,2

2,9

Taxa de casos de limfogranulona veneri per 100.000 habitants

Any 2018

El Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS/HIV/SIDA de Catalunya (CEEISCAT) es va crear l'any 1995 com un òrgan de suport tècnic al Departament de Salut i a les ONGs catalanes del sector en matèria de prevenció i control del VIH i les ITS. El CEEISCAT està físicament ubicat al Campus de Can Ruti, formant part del Institut Català d'Oncologia (ICO). Actualment el centre té un component programàtic i un de recerca. El primer l'executa en dependència directa del Programa de Prevenció, Control i Assistència del VIH/ITS i hepatitis víriques (PCAVIHV) de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) del Departament de Salut, actuant -de forma coordinada amb la Subdirecció General de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències i en el context de la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya- com a òrgan referent de la vigilància epidemiològica del VIH i les ITS, així com del monitoratge i avaluació de les epidèmies de VIH, ITS i Hepatitis Víriques. El component de recerca es realitza en el marc de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP).

Els sistemes d'informació i estudis observacionals realitzats pel CEEISCAT constitueixen el Sistema Integrat de Vigilància Epidemiològica de ITS/VIH/ITS (SIVES) de Catalunya que incorpora la informació necessària per construir un conjunt d'indicadors epidemiològics de referència per descriure els patrons epidemiològics de l'epidèmia del VIH/SIDA i altres ITS, identificar els seus determinants i avaluar la resposta a aquestes epidèmies.

Els indicadors estan alineats amb les propostes de diversos organismes internacionals (UNAIDS, ECDC, WHO) per tal de disposar d'informació harmonitzada i comparable per fer el seguiment dels compromisos de lluita contra el VIH i la SIDA a nivell mundial i europeu en particular amb la "The Dublin Declaration on Partnership to Fight HIV/AIDS in Europe and Central Asia" i donen resposta al Pla d'Acció enfront del VIH/sida/ITS de Catalunya i es constitueixen com a part del seu propi sistema d'avaluació.

Indicadors epidemiològics clau pel monitoratge i avaluació del VIH/ITS a Catalunya

2018

Generalitat de Catalunya
Agència de Salut Pública de Catalunya
Programa de Prevenció, Control i Atenció al VIH, les ITS i les Hepatitis Viriques

CEEIS
Cat Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya

Proporció de migrants entre els nous diagnòstics de VIH

44%

613

Nous diagnòstics de VIH notificats al registre

8,1

Taxa de nous diagnòstics de VIH per 100.000 habitants

82

Nous diagnòstics per VIH (+15 anys)

- Dones heterosexuales
- PID
- Desconegut

Distribució de transmissió

81

Casos de SIDA

+19%

60,5

51

Taxa de casos de gonocòccia per 100.000 habitants

+4%


22,9

23,8

Taxa de casos de sífilis infecciosa per 100.000 habitants

Any 2017

Cascada de serveis del VIH



Diagnòstic i tractament

Taxa de proves de detecció del VIH per 1.000 habitants (2017)	42,8
Diagnòstic tardà del VIH	44%
Diagnòstic tardà del VIH en persones migrants	52%
Proporció de pacients diagnosticats a l'Atenció Primària amb una condició indicadora del VIH als quals se'ls realitza la prova del VIH en els 4 mesos posteriors a la data del diagnòstic en homes	19,8%
Proporció de pacients diagnosticats a l'Atenció Primària amb una condició indicadora del VIH als quals se'ls realitza la prova del VIH en els 4 mesos posteriors a la data del diagnòstic en dones	16,4%
Estimació de la proporció del nombre de casos de VIH declarats al registre que s'han diagnosticat inicialment en centres comunitaris	31,6%

Prevalença de reactivitat en els centres de cribratge comunitari	1,3%
Proporció de persones amb una prova VIH reactiva realitzada en un centre comunitari vinculades al sistema sanitari	88,5%
Retenció al tractament als 12 mesos en homes	98,5%
Retenció al tractament als 12 mesos en dones	98,8%
Probabilitat de supervivència més enllà dels 5 anys des de l'inici de tractament en els nous diagnòstics del VIH que no presenten un retard de diagnòstic en homes	97,1%
Probabilitat de supervivència més enllà dels 5 anys des de l'inici de tractament en els nous diagnòstics del VIH que no presenten un retard de diagnòstic en dones	96,5%

Poblacions clau (%)

	Dones treballadores sexuals (2018)	Homes treballadors sexuals (2018)	Dones trans treballadores sexuals (2018)	Homes que tenen sexe amb homes (2017)	Persones que s'injecten drogues (2014-15)		Presons (2018)		Joves (ASSIR 16-25 anys, 2018)	
					Homes	Dones	Homes	Dones	Homes	Dones
Prevalença de VIH	3	25,5	25,3	16,6 (autodeclarada)	26,8	29	5	6,2		
Prevalença de sífilis		19,1 (autodeclarada)	15,6 (autodeclarada)	6,2 (autodeclarada)			0,6	0,5		
Prevalença de clamídia	1,8	10,6	10,1				0,2	0,5	11,2	8,1
Prevalença de gonocòccia	0,5	19,1	19,2				0,1	0,5		
Seroprevalença d'hepatitis virus C		5,1	1,2		67,4	58,1	4,9	5		
Hepatitis virus C crònica (càrrega viral)							1,6	1,4		
Persones que s'han realitzat la prova del VIH i coneixen els seus resultats en els últims 12 mesos	60,1	64	81,9	70,5	72	72,5	40,5	40,8		
Ús del preservatiu en la darrera relació sexual	92,6 (client fix)	92,9	87		75,2 (parella ocasional)	71 (parella ocasional)			50	52,3
Persones amb el VIH coinfectades per hepatitis virus C				11,5	79,7	66,7	1,1	2		

Prevençió i serveis d'atenció al VIH

Reducció de danys. Ús de xeringues estèrils (sempre) en els darrers 6 mesos en homes	88,7%
Reducció de danys. Ús de xeringues estèrils (sempre) en els darrers 6 mesos en dones	83,6%
Cobertura de la teràpia de substitució d'opiacis	60-80%
Cobertura de la promoció i distribució de preservatius en homes que tenen sexe amb homes (2017)	42,5%
Cobertura de la promoció i distribució de preservatius en dones treballadores sexuals	87,3%