


# CEWVIH

CÍRCULO DE ESTUDIANTES VIVIENDO CON VIH

EMBARAZO



POSITIVO

La transmisión vertical (TV) es una de las tres vías de transmisión de VIH, junto a la sexual y la intravenosa-sanguínea, y puede ocurrir durante el periodo de gestación, parto o lactancia donde una mujer seropositiva puede transmitir VIH a su hijx

"Hace 5 años, cuando recibí la primera notificación de que posiblemente era VIH reactivo, decidí que no tendría hijxs. Aunque de pequeña fue un sueño ser mamá joven. No lo vi como algo negativo, solo algo que no debía hacer ya que no me sentía con el derecho de traer a alguien al mundo con mi "condición". Al paso de los años seguí con la misma idea. Hasta que un día me vi con 25 años, sentada en el sillón sin grandes responsabilidades re-preguntándome el por qué no sería madre, siendo que el último año había conocido varias mamás con VIH que tuvieron sus hijxs en los años 90', donde sí era un riesgo real ser madre seropositiva, ya que no existían protocolos tan estructurados como hoy en día. Si yo tengo todas las herramientas para ser madre y que mi hijo nazca sin VIH, **¿Por qué no?**


Al mes de estar cuestionándome esto en el sillón, me entero de que estoy embarazada y que ese bebé vino a decirme que no había nada que cuestionarse en torno a lo médico, que solo depende de mí y mi pareja ser perseverantes como cualquier padre"

**Catalina Peñaloza (+), madre de M. (-)**

Cuando una mujer que vive con VIH se embaraza y posee una buena adherencia al tratamiento, logrando su indetectabilidad



**Los peligros de la transmisión vertical son casi nulos**

A dark silhouette of a pregnant woman is centered in the background. The text is overlaid on this silhouette.

Desde los 90' hasta el 2018 hubo un recuento de 382 casos de niños que habían nacido con el virus\*.

(+)

Desde que Chile se comprometió con la la eliminación de la Transmisión Materno Infantil del VIH el año 2010, la norma se actualizó, se creó un comité nacional para la eliminación, se organizó a las 15 regiones y se realizaron capacitaciones en todo el país.

Aquel trabajo permitió que hoy Chile tenga una de las tasas más bajas de trasmisión vertical del virus de los últimos años.

## AÑO (NIÑXS)\*

2001 (30)	2009 (13)
2002 (28)	2010 (6)
2003 (20)	2011 (12)
2004 (22)	2012 (11)
2005 (18)	2013 (5)
2006 (9)	2014 (8)
2007 (12)	2015 (10)
2018 (12)	2016 (3)



\*Unidad de transparencia, MINSAL, 2017.