



LEÓN

7 al 10 de
Septiembre de 2021

Evidencias para pandemias

Factores psicosociales y su relación con las conductas de riesgo sexual al VIH/ITS en mujeres transgénero y hombres que ejercen el trabajo sexual en Cataluña

J Mesías-Gazmuri^{1,2,3}, C Folch^{1,2,4}, J Reyes-Urueña^{1,2,4}, L Egea Cortés^{1,2}, A Morales⁵, L Villegas⁵, J Casabona^{1,2,4}

¹ Centre Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya (CEEISCAT)/ Agència de Salut Pública de Catalunya; ² Institut d'Investigació Germans Trias i Pujol (IGTP), Badalona; ³ Doctorat Metodologia de la Recerca Biomèdica i Salut Pública, Universitat Autònoma de Barcelona; ⁴ Ciber Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP); ⁵ StopSida.



Antecedentes

Las mujeres transexuales (mujeres trans) y los hombres cisgénero (hombres) que ejercen el trabajo sexual son poblaciones vulnerables a la infección por el VIH/ITS.

Son grupos poco visibles, de difícil acceso, que se enfrentan a barreras de acceso a los servicios de promoción, prevención, tratamientos y cuidados en salud.

Sindemia es la co-ocurrencia de dos o más enfermedades o condiciones psicosociales que interactúan entre sí, y contribuyen a un exceso de carga del problema de salud en una persona o población.

Escasez de estudios a nivel internacional, sus necesidades han sido poco estudiadas.

En España, también existe poca información y no se tienen en cuenta los factores multinivel.



Objetivos

- Describir la prevalencia de factores psicosociales en mujeres cis y hombres trans que ejercen el trabajo sexual en Cataluña y su asociación con las conductas sexuales de riesgo.
- Evaluar si a mayor ocurrencia de factores sindémicos se relaciona con un aumento de conductas de riesgo sexual para VIH/ITS.

Métodos

- Estudio descriptivo basal de una cohorte de mujeres trans y hombres cis trabajadores sexuales VIH-negativos que acuden a un centro comunitario entre 2014 y 2018.
- Los factores sindémicos (FS) fueron: 1. Consumo frecuente de alcohol en las relaciones sexuales con clientes; 2. Policonsumo de drogas (>2) en las RS con clientes; 3. Haber sufrido violencia verbal, física o sexual; 4. No contar con seguro médico o tarjeta sanitaria.
- Las variables dependientes de riesgo fueron: 1. Penetración anal sin condón con clientes; 2. >10 clientes/semana; 3. Diagnóstico previo de ITS.
- Se calculó el Índice Sindémico según el número acumulado de FS (0 a 4).
- Se realizaron modelos de regresión logística para analizar la asociación entre los comportamientos de riesgo sexual y los FS, así como los comportamientos de riesgo sexual y el Índice Sindémico, ajustado por género, edad, país de origen.




Figura 2.

Distribución del índice sindémico en hombres y mujeres trans que ejercen el trabajo sexual




Figura 3.

Asociación entre los Factores Sindémicos y los Comportamientos de Riesgo Sexual. Análisis de regresión multivariada.





Figura 4.

Asociación entre el índice sindémico con los comportamientos sexuales de riesgo. Análisis de regresión multivariada.





Conclusiones

- Se confirma una elevada prevalencia de factores sindémicos, entre los más frecuentes se encuentra el haber sufrido algún tipo de violencia, seguido del consumo frecuente de alcohol, principalmente entre las mujeres trans.
 - Se observa una asociación entre los factores sindémicos y las conductas de riesgo sexual
 - Se observa una tendencia positiva entre el Índice Sindémico y los comportamientos de riesgo sexual, lo que proporciona evidencia de una interacción aditiva entre el número de factores y el riesgo sexual entre MTTTS y HTS.
 - Las intervenciones preventivas de VIH e ITS dirigidas a estas poblaciones tienen que incluir aspectos psicosociales y estructurales, más allá de las conductas individuales.
- 