


Si tomas medicamentos del VIH y llevas más de 6 meses con carga viral indetectable, es prácticamente imposible que puedas transmitir el VIH a través del sexo.

TRATAMIENTO COMO PREVENCIÓN DEL VIH



01

Un estudio observó que algunas personas con el VIH y carga viral indetectable habían dejado de usar el preservativo con sus parejas sin VIH. Al analizar los datos de miles de estas parejas no se detectó ningún caso de transmisión del VIH.

02

Con 6 meses de carga viral indetectable también puedes plantearte tener hijos mediante concepción natural con tu pareja. Con un seguimiento médico adecuado, resulta seguro tanto para la pareja como para el bebé.



03

Con todo, a pesar de que el tratamiento previene la transmisión del VIH, este argumento nunca debe ser utilizado para obligar a una persona con el VIH a que inicie el tratamiento de forma inmediata si no se siente preparada ni para discriminar a aquellas personas con VIH que no tienen carga viral indetectable.

gt grupo de trabajo sobre tratamientos del VIH
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
ONG DE DESARROLLO

SUBVENCIÓN



POR SOLIDARIDAD
OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL



Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida



Generalitat de Catalunya
Agència de Salut Pública
de Catalunya



Generalitat de Catalunya
Departament
de Justícia



ÀREA DE QUALITAT DE VIDA,
IGUALTAT I ESPORTS



Diputació
Barcelona
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

COLABORA



ETIS
EQUIP DE TREBALL SOBRE
IMMIGRACIÓ I SALUT



TROPICAL
DRASSANES



¿TIENES DUDAS
SOBRE EL TEMA?
PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41
consultas@gtt-vih.org