Si tienes que hacerte una prueba de VIH, llámanos.

93 298 06 42

www.facebook.com/gaispositius

@gaispositius

Gaispositius

Violant d'Hongria, 156 baixos
08014 - Barcelona Tel. 93 298 06 42
gaispositius@gaispositius.org



Con la colaboración de:

Ajuntament de Barcelona

Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar Social i Família
Secretaria General

Profilaxis Post Exposición PPE

Gaispositius

PPE

La Profilaxis Post Exposición (PPE) es una medida de prevención que puede reducir la posibilidad de infectarte por el VIH después de una práctica de riesgo.

Para solicitarla:

- **Dirígete al servicio de urgencias de un hospital** de la Seguridad Social.

- Intenta pedirla **antes de que pasen 6 horas** desde la práctica de riesgo ya que en ese periodo su eficacia es mayor. Si no es posible cuentas con un plazo máximo de 72 horas (3 días) para pedirla.

- Indícale al profesional que te atienda que ha sucedido para que valore si has de tomar la PPE.

- Si te la administran durante 28 días tomaras antirretrovirales.

Es recomendable solicitar la PPE si se ha roto o no se ha usado el condón en penetraciones anales y/o vaginales. No está indicada en los casos de sexo oral si durante el mismo no has mantenido contacto con la sangre o semen de la otra persona.

Has de tener en cuenta que:

- La PPE no sustituye el uso del condón como método de prevención.

- La Profiláxis Post Exposición no siempre funciona.

- Durante los primeros días del tratamiento pueden haber efectos secundarios como: malestar general, nauseas, diarréas y vómitos.

- Es importante no interrumpir el tratamiento para que sea eficaz.

En resumen:

* **Puedes evitar la infección por VIH** pidiendo la Profiláxis Post Exposición.

* Solicítala en los **servicios de urgencias** de cualquier hospital de la Seguridad Social.

* Pídela antes de que pasen **6 horas** desde la práctica sexual de riesgo pero si no es posible recuerda que tienes un **plazo máximo de 72 horas (3 días).**

* Si te la administran podrían aparecer algunos efectos secundarios al inicio del tratamiento o mientras dure.

* Mientras tomes la PPE no eres inmune al VIH si tienes prácticas de riesgo.

* La eficacia de la PPE disminuirá si interrumpes el tratamiento.