

VIH

Virus d'Immunodeficiència Humana. El virus en entrar al cos ataca progressivament el sistema immunitari (defenses).

Quan el sistema immunitari és destruït, els signes i símptomes del SIDA apareixen.

SIDA

S (Síndrome) Conjunt de símptomes i de signes

I (de Inmune) > Debilitament important
D (Deficiència) > del sistema immunitari

A (Adquirida) No hereditària sinó a causa d'un virus

Quan una persona s'infecta pel VIH pot transmetre el virus a d'altres encara que no hagi desenvolupat la malaltia (SIDA)

alas

...és el nom de l'Associació de Lluita Anti-Sida de les Illes Balears que des de l'any 1987 treballa per millorar la qualitat de vida de les persones seropositives i el seu entorn més pròxim.

tel. informació: 971 715 566
www.alas-baleares.com


ALAS Mallorca

Plaça Cardenal Reig nº4, 1º - A
07004 Palma de Mallorca
tel. secretaria: 971 714 488
fax: 971 496 218
e-mail: alas@alas-baleares.com

ALAS Ibiza

C/ Madrid nº58, 1ºB
07800 Ibiza
tel. secretaria: 971 312 357
fax: 971 312 357
e-mail: ibiza@alas-baleares.com

B01
B/22136



alas

Associació de Lluita Anti-Sida de les Illes Balears

Programes

*Atenció Social

*Atenció Psicològica

*Angelets. Atenció a la Infància i l'Adolescència

*Serobús. Unidat Mòbil de Prevenció i Informació

*Telèfon de Informació i Ajuda al VIH/SIDA

Activitats

Taules Informatives/

Tallers de Sexe Segur i Tallers de Sexualitat/

Cursos de Formació i Reciclatge de voluntariat/

Memorial, en record de les persones

que han mort de SIDA/

1 Desembre, Dia Mundial del Sida/

Campanyes de Prevenció/

Activitats associatives/

Via de transmissió SEXUAL

Pràctiques de risc

Penetració vaginal, anal o sexe oral sense preservatiu

Prevenció

Penetració vaginal, anal i sexe oral amb preservatiu

Via de transmissió MARE-FILL

Pràctiques de risc

Durant l'embaràs, part o lactància

Prevenció

Seguiment ginecològic des del principi de l'embaràs

Tractament amb medicaments

Part per cesàrea

Evitar lactància materna, sí llet en pols

Via de transmissió SANGUÍNEA

Pràctiques de risc

Contacte de dues ferides obertes i sagnants

Ús compartit d'agulles, xeringues, objectes tallants i

estris personals (fulles d'afaitar, raspall de dents...)

Prevenció

No compartir agulles, xeringues, objectes tallants i

estris personals (fulles d'afaitar, raspall de dents...)

Per a Tatoos i piercings sol·licitar material d'un sol

ús o degudament esterilitzat

PROVA SEROLÒGICA

És un simple anàlisi de sang que detecta la presència d'anticossos front al VIH en el nostre organisme. Per obtenir un resultat fiable han de passar tres mesos des de l'última pràctica de risc.

T'HAURÍES DE FER LA PROBA SI...

Has mantingut relacions sexuals sense preservatiu. Si has compartit utensilis o objectes tallants o punyents que hagin estat en contacte amb sang d'altres persones.

ON FER-SE LA PROBA

De forma gratuïta:

Centres d'Atenció Primària.

A nivell privat (cost aproximat de 30 €):

Centres d'anàlisis.