



**Si ets personal sanitari,  
el teu paper en el diagnòstic precoç  
del VIH és molt important.**

**RECORDA**

**Gairebé un 50% de les infeccions pel VIH es diagnostiquen massa tard (<350 CD4).**

**Convé oferir una prova de VIH a les persones que:**

- Estiguin embarassades o tinguin previst quedar-s'hi.
- Hagin patit alguna infecció de transmissió sexual, tuberculosi o hepatitis vírica.
- Tinguin una parella estable i vulguin deixar de fer servir el preservatiu amb la parella.
- Hagin mantingut relacions sexuals amb penetració (anal, vaginal i oral amb ejaculació) sense preservatiu amb alguna persona amb VIH o l'estat serològic de la qual desconexien.
- Hagin compartit el material per injectar-se o esnifar drogues.
- Presentin una patologia indicativa de possible infecció pel VIH.

**Recomana la prova. Atura la sida**

En general, cal fer la prova del VIH a qualsevol persona que ho sol·liciti.

**1 de desembre, Dia Mundial de la Sida**

**ATURA LA SIDA. DETÉN EL SIDA. STOP AIDS.**

**GELDIARAZI HIESA. DETÉN A SIDA. STOP SIDA. PARA LA SIDA.**

**ОСТАНОВИТЕ СПИД. 拒绝爱滋. لنوقف الإيدز.**