www.gtt-vih.org

Si tienes dudas sobre **PREZISTA®** o cualquier otro medicamento antirretroviral, contacta con nosotr@s:

Servicio de Consultas del Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH acerca de la infección por VIH, las enfermedades asociadas y sus tratamientos.

Consultas presenciales (con cita *previa) en nuestra sede* y **telefónicas 93 458 26 41**: Lunes y Miércoles de 11:00h a 18:00h

Las consultas por correo electrónico a **consultas@gtt-vih.org** se atienden de lunes a viernes por orden de recepción y en la mayor brevedad posible.

EFECTOS SECUNDARIOS (continuación)

La lipodistrofia es un efecto secundario claramente asociado a la terapia antirretroviral. Aunque no se ha podido establecer de forma concluyente la causa, a menudo se han podido relacionar más frecuentemente algunos de sus signos con algunas clases de fármacos.

En caso de manifestar algún efecto secundario (mencionado o no aquí) es conveniente ponerlo en conocimiento de tu médico/a, con quien podrás tomar las decisiones que más se adapten a tu caso en particular. A veces se trata simplemente de efectos iniciales de adaptación al fármaco que desaparecen con el tiempo.

PREZISTA® y EMBARAZO

Podrías seguir tomando **PREZISTA®** durante el embarazo si está siendo una buena opción terapéutica para ti. Puedes hablar de ello con tu médico/a si estás planeando quedarte embarazada o ya lo estás.

La lactancia es una vía de transmisión del VIH, por ello se recomienda a las madres con VIH que eviten amamantar a sus hijos.

INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS

Medicamentos contraindicados con PREZISTA®:

- Antituberculostáticos: rifampicina.
- Antiarrítmicos: amiodarona, bepridil, quinidina, lidocaína sistémica.
- Antihistamínicos: astemizol, terfenadina.
- Antimigrañosos: dihidroergotamina, ergonovina, ergotamina, metilergonovina.
- Antipsicóticos: pimozida, sertindol.
- Sedantes/Hipnóticos: triazolam, midazolam.
- Hipolipemiantes: simvastatina, lovastatina.
- Antiepilépticos: fenobarbital, fenitoína, carbamazepina.
- Hipérico (Hierba de San Juan).

Medicamentos que aumentan la acción de PREZISTA®:

- Antifúngicos: ketoconazol (se recomienda una dosis máxima diaria 200mg), itraconazol, clotrimazol.
- Inhibidores de la proteasa: CRIXIVAN®. Podría precisarse un ajuste de CRIXIVAN®, de 800mg a 600mg.

Medicamentos que aumentan su acción con PREZISTA®:

- Antirretrovirales: SUSTIVA®.
- Medicamentos para la disfunción eréctil:
  - Sildenafilo: Se recomiendan dosis únicas no superiores a 25mg en 48 horas.
  - Vardenafilo: Se recomiendan dosis únicas no superiores a 2,5mg en 72 horas.
  - Tadalafilo: Se recomiendan dosis únicas no superiores a 10mg en 72 horas.
- Antituberculostáticos: rifabutina. Se recomiendan dosis de 150mg en días alternos.
- Antiarrítmicos: digoxina.
- Antibióticos: claritromicina.
- Antifúngicos: ketoconazol (se recomienda una dosis máxima diaria de 200mg), itraconazol.
- Antihipertensivos: felodipino, nifedipino, nicardipino.
- Hipolipemiantes: atorvastatina, pravastatina.
- Inmunosupresores: ciclosporina, tacrolimus, sirolimus.
- Anticoagulantes: las concentraciones de warfarina se pueden modificar cuando se coadministra con PREZISTA®.

Medicamentos que disminuyen su acción con PREZISTA®:

- Antifúngicos: voriconazol. Se desaconseja la coadministración.
- Los anticonceptivos orales a base de estrógenos podrían perder su eficacia. Es recomendable utilizar otros métodos alternativos de *anticoncepción*.
- En los tratamientos de sustitución de opiáceos se recomienda la vigilancia estrecha, especialmente con metadona, para evitar el síndrome de abstinencia.
- Antidepresivos: paroxetina, sertralina.

Es importante que tu médico/a sepa todos los medicamentos que estás tomando, incluyendo los suplementos vitamínicos, plantas medicinales o preparados homeopáticos.

PREZISTA®

grupo de trabajo sobre tratamientos del VIH
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

c/ Sardenya, 259 3º 4ª 08013 Barcelona (España)
TEL: +34 93 208 08 45 FAX: +34 93 207 00 63
E-MAIL: contact@gtt-vih.org WEBSITE: www.gtt-vih.org

QUÉ ES PREZISTA®

'A® es un medicamento para tratar la
n por VIH

edicamentos anti-VIH actualmente
bles se dividen en cuatro grandes
:

nhibidores de la proteasa. Al bloquear
nzima, la proteasa, desorganizan la
ción de nuevas proteínas virales en las
infectadas. Así se producen virus no
ales. Los inhibidores de la proteasa son:
S® , CRIXIVAN®, INVIRASE®, KALETRA®,
®, PREZISTA®, REYATAZ®, TELZIR®.

nhibidores de la transcriptasa inversa
os de nucleósido/nucleótido. Impiden
transcriptasa inversa actúe para
tar la infección de la célula por el virus

álogos de nucleósido/nucleótido son:
VIR®, EMTRIVA®, EPIVIR®, KIVEXA®,
RETROVIR®, TRIZIVIR®, TRUVADA®, VIDEX®, VIREAD®, ZERIT®, ZIAGEN® y el genérico ZIDOVUDINA.

3. Los inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de nucleósido. También impiden que la transcriptasa inversa actúe para completar la infección de la célula por el virus VIH, pero con un mecanismo diferente.
Los inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de nucleósido son: VIRAMUNE®, SUSTIVA®.

4. Los inhibidores de la entrada. Impiden que el VIH entre en la célula a infectar. El único fármaco de esta familia que está comercializado evita que se fusionen las membranas del VIH y de la célula, de ahí su nombre.
Inhibidor de la fusión: FUZEON®.

PREZISTA® pertenece a la familia de los inhibidores de la proteasa.

POR QUÉ TOMAR PREZISTA®

El objetivo del tratamiento antirretroviral es llevar y mantener la carga viral por debajo de los niveles de detección (carga viral indetectable) y aumentar el número de linfocitos T CD4 a fin de restablecer la inmunidad y reducir el riesgo de desarrollar infecciones oportunistas. De esta forma, puede mejorarse el estado de salud. La terapia antirretroviral es una combinación de medicamentos. **PREZISTA®** se prescribe para tomar junto a otros fármacos antirretrovirales.

Poder seguir la pauta prescrita es uno de los mayores problemas de los medicamentos anti-VIH. Debido al riesgo de aparición de virus resistentes, es conveniente tomar los medicamentos siempre de una forma regular.

PREZISTA®, MODO DE EMPLEO

PREZISTA® se presenta en comprimidos que contienen 300mg de darunavir. Los comprimidos son ovalados y de color naranja.

PREZISTA® se coadministra siempre con NORVIR®. Ambos medicamentos se toman juntos, puesto que NORVIR® sirve para potenciar **PREZISTA®**.

La dosis diaria habitual de **PREZISTA®** es de 2 comprimidos (un total de 600mg cada vez), más 1 comprimido de 100mg de NORVIR®, ambos dos veces al día, cada doce horas.

Los comprimidos de **PREZISTA®** han de tomarse con comida, cualquier tipo de comida es válido ya que no afecta a los niveles del fármaco.

Puedes llevar los comprimidos de **PREZISTA®** en un pastillero seco y bien cerrado.

Si te olvidas una dosis de **PREZISTA®** y no ha pasado mucho tiempo (hasta 6 horas) intenta tomarla lo antes posible. Luego puedes seguir con el horario habitual. Si queda menos tiempo para la siguiente dosis, se recomienda esperar y tomarla entonces. En ningún caso se recomienda tomar una dosis doble.

En caso de vomitar en el plazo de una hora desde la toma de **PREZISTA®** se recomienda tomar otra dosis. Si el vómito ocurre más tarde no será necesario volver a tomar el medicamento.

PREZISTA® está contraindicado en los casos de enfermedad hepática grave.

Si tienes hemofilia tipo A o B y en tu tratamiento para el VIH se incluyen inhibidores de la proteasa, es importante que sepas que podría *producirse un aumento de las hemorragias.*

Incluso estando en tratamiento antirretroviral, existe el riesgo de transmisión del VIH a otra persona.

EFECTOS SECUNDARIOS

Los efectos secundarios más frecuentemente asociados a **PREZISTA®** son: diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, flatulencia, estreñimiento, dispepsia (dolor en la zona del estómago), cefalea, mareos, debilidad, fatiga e insomnio.

Tomando **PREZISTA®** se ha descrito en algunos casos modificaciones en los análisis sanguíneos como un aumento de colesterol y triglicéridos, de la lipasa pancreática, de marcadores de función hepática o de la coagulación o reducciones en el recuento total absoluto de neutrófilos y linfocitos.

Al igual que con todos los medicamentos anti-VIH, tu médico/a te realizará controles regulares mientras estés recibiendo **PREZISTA®**.

PREZISTA® podría provocar algún tipo de erupción cutánea. Si apareciera, ésta suele ser leve o moderada y pasajera, aunque podría ser más grave y por ello es importante que lo pongas en conocimiento de tu médico/a o personal sanitario.

En estudios clínicos con **PREZISTA®** coadministrado con NORVIR® se han observado casos de reactivación de Herpes Simple y Herpes Zóster.