



WWW.BCNCHECKPOINT.COM

933 182 056



jovespositius

## bcn checkpoint

BCN Checkpoint és un centre comunitari de detecció del VIH i altres infeccions de transmissió sexual (ITS) per a homes gais

**PROVES DEL VIH I LA SÍFILIS  
SERVEI GRATUÏT, ANÒNIM I CONFIDENCIAL**

hispano**sida**



Generalitat de Catalunya  
Departament d'Acció Social i Ciutadania  
Secretaria de Joventut

B10  
B/26856

Now Playing

**ITS >>>> SÍMPTOMES**

Gonorrea i Clamídia  
Condilomes  
Herpes  
Hepatitis A i B  
VIH/Sida  
Sífilis

3:41

-1:20

MENÚ



## ITS ▶▶▶ SÍMPTOMES

### **Gonorrea i Clamídia**

Secreció aquosa i/o purulenta (groguenca o blanquinosa) del penis o anus.  
Necessitat d'orinar més sovint de l'habitual.  
Ardor o dolor en orinar o defecar.  
Irritació de la gola.

### **Condilomes (berrugues genitals)**

Petites berrugues a la boca, penis i/o anus (és convenient eliminar-les com més aviat millor). Irritació o coïssor al voltant dels òrgans sexuals.  
Les berrugues poden reapareixer.

### **Herpes**

Butllofes petites i doloroses als òrgans sexuals o a la boca. Irritació o coïssor abans de l'aparició de les butllofes.  
Les butllofes romanen d'una a tres setmanes (encara que desapareguin, l'herpes segueix a l'organisme). Les butllofes poden reapareixer.

### **Hepatitis A i B**

Síntomes semblants als de la grip que duren més del normal. Cansament.  
Icterícia (pell groga).  
Enfosquiment de l'orina. Femta de color més clar de l'habitual.

### **Sífilis**

#### **1a fase (o sífilis primària):**

Apareixen un o varis xancres (un tipus de nafres o úlceres) a la boca, el penis i/o l'anus. Els xancres romanen d'una a cinc setmanes (però la sífilis segueix present a l'organisme).

#### **2a fase (o sífilis secundària):**

Els símptomes apareixen entre una setmana i sis mesos després de la desaparició dels xancres.  
Erupció o granellada arreu del cos (especialment en els palmells de les mans).  
Síntomes semblants als de la grip (febres, fatiga, etc.).  
Les erupcions i els símptomes gripals desapareixen (però sense tractament la infecció seguirà evolucionant).

### **VIIH-Sida**

#### **Infecció aguda (persones recentment infectades):**

Síntomes semblants als de la grip que duren més del normal. Febre, cansament, diarrea.  
Inflamació dels ganglis limfàtics.

#### **Infecció crònica:**

El virus pot viure a l'organisme uns anys sense manifestar-se. Els símptomes apareixen mesos i fins i tot anys després de la infecció, per això és important fer-se la prova.



**933 182 056**

**bcn** checkpoint

Comte Borrell 164 - 166 / 08015 Barcelona