

CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES RECIÉN DIAGNOSTICADOS DEL VIH, SEGÚN EL SEXO, EN UNA CLÍNICA DE ITS EN MADRID

Mar Vera⁽¹⁾, Carmen Rodríguez⁽¹⁾, Teresa Puerta⁽¹⁾, Oskar Ayerdi⁽¹⁾, Montserrat Raposo⁽¹⁾, Jorge Pérez⁽²⁾, Jorge del Romero⁽¹⁾
 CS Sandoval. IdISSC, Madrid⁽¹⁾, Hospital Virgen de la Luz, Cuenca⁽²⁾

OBJETIVOS

- 1) Evaluar la prevalencia del VIH y otras ITS concomitantes al diagnóstico del VIH, según el sexo, en una clínica de ITS en Madrid.
- 2) Analizar las características sociodemográficas, clínicas y conductuales de los pacientes recién diagnosticados del VIH 2007-2012 en hombres, mujeres y transexuales.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un análisis descriptivo retrospectivo de los pacientes diagnosticados del VIH entre 2007-2012 y se recogieron las características sociodemográficas, clínicas y conductuales en un cuestionario epidemiológico validado y estandarizado.

RESULTADOS

En el periodo descrito 34.627 personas solicitaron la prueba del VIH en el C.S. Sandoval.

De los 1.629 pacientes recién diagnosticados de infección por el VIH: un 93,2% (1.519) eran **hombres**, un 5,1% (83) **mujeres**, y 1,7% **transexuales** (27).

La distribución de los pacientes en función de la categoría de transmisión y el sexo fue: 1.363 hombres que tenían sexo con hombres (1.359 hombres y 4 transexuales), 128 trabajadores del sexo (105 hombres y 23 transexuales), 105 heterosexuales (44 hombres y 61 mujeres), 12 usuarios de drogas inyectadas (10 hombres y dos mujeres), 16 trabajadoras femeninas del sexo y en 5 pacientes la vía de transmisión desconocida (4 mujeres y un hombre).


Con respecto a la edad de los diagnosticados, el 44% de los hombres y el 35% de las mujeres tenían entre 30 y 39 años y el 70,4% de las TSX entre 20 y 29 años.

Según la región de procedencia, el 58 % de los hombres eran españoles y el 92,3% de las transexuales y 38,6% de las mujeres procedían de Latinoamérica


Los hombres y las transexuales atribuyeron como posible transmisor del VIH a una pareja ocasional (62% y 45%) y las mujeres a la pareja estable (54%).

El porcentaje hombres y transexuales con antecedentes de ITS fue alto. Las mujeres presentaron menor porcentaje de otras ITS concomitantes al diagnóstico del VIH que los hombres y las transexuales.

Porcentaje de antecedentes de ITS y coinfección del VIH y otras ITS



Consumo de tóxicos y relaciones sexuales no protegidas bajo el efecto de estos (RSNP), según el sexo



CONCLUSIONES

- El perfil de los hombres y mujeres recién diagnosticados del VIH es totalmente diferente. Los hombres se infectaron por relaciones homosexuales y las mujeres por relaciones heterosexuales.
- En los hombres destaca la alta incidencia otras ITS al VIH y un elevado consumo de alcohol y otras drogas recreativas.