

Infecciones de transmisión sexual concomitantes al diagnóstico de la infección por el VIH



Autores: Oskar Ayerdi Aguirrebengoa, Mar Vera García, Teresa Puerta López, Blanca Menéndez Prieto, Juan Carlos Carrio Montiel, Inmaculada Mozo Mamolar, Montserrat Raposo Utrilla, Carmen Rodríguez Martín, Jorge Del Romero Guerrero. Centro Sanitario Sandoval. IdISSC.

Introducción/Objetivos: Evaluar la incidencia de infecciones de transmisión sexual (ITS) concomitantes al diagnóstico del VIH en una clínica de ITS.

Material y métodos:

Estudio descriptivo transversal de los pacientes diagnosticados de infección por el VIH. A todos los nuevos diagnósticos del VIH realizados en el centro Sanitario Sandoval en los años 2014 y 2015, se les pasó un cuestionario epidemiológico estructurado que recogía datos sociodemográficos y clínicos. En el momento del diagnóstico del VIH se realizó un despistaje de otras ITS.

Resultados:



Las ITS concomitantes más frecuentes fueron: gonococia de localización rectal, lúes latente de duración desconocida y clamidiasis de localización rectal. Otras ITS menos frecuentes fueron los condilomas y el herpes genital (ver tabla).

ITS concomitante al diagnóstico del VIH	%(n/N)
Presencia de ITS Concomitante	49,6 (292/589)
<i>Neisseria gonorrhoea</i>	45,5 (133/292)
Rectal	68,4 (91/133)
Uretral	12,8 (17/133)
Faríngea	42,9 (57/133)
Faríngea + Rectal	47,4 (27/57)
Cérvix	0 (0/133)
<i>Chlamydia trachomatis D-K</i>	32,2 (94/292)
Rectal	83 (78/94)
Uretral	9,6 (9/96)
Faríngea	13,8 (13/94)
Faríngea+ Rectal	30,8 (4/13)
Cérvix	2,1 (2/94)
<i>Chlamydia trachomatis L1-L3 (LGV)</i>	3,4 (10/292)
Rectal	100 (10/10)
Sífilis	32,5 (95/292)
Lúes 1a	11,6 (11/95)
Lúes 2a	14,7 (14/95)
Lúes latente precoz	7,4 (7/95)
Lúes latente duración desconocida	66,3 (63/95)
Hepatitis B Crónica	1 (3/292)
Hepatitis C	2,1 (6/292)
Condilomas acuminados	9,6 (28/292)
Perianal	57,1 (16/28)
Genital	28,6 (8/28)
Perianal + genital	14,3 (4/28)
Herpes anogenital	4,1 (12/292)
<i>Molluscum contagiosum</i>	0,34 (1/292)
Escabiosis	1 (3/292)
Pediculosis pubis	0
Tricomonas	0

Conclusiones:

Es frecuente la presencia de otras ITS concomitantes al diagnóstico del VIH, especialmente en HSH y en transexuales. Hay una mayor incidencia de ITS en los pacientes más jóvenes.

Es recomendable efectuar un despistaje de otras ITS en todos los pacientes diagnosticados del VIH.