

LE TRAITEMENT D'URGENCE POUR LE VIRUS DU SIDA

QUAND ?

- En cas d'exposition accidentelle au virus du VIH (rupture du préservatif, partage de seringue)
- Débuter le traitement le plus tôt possible après l'exposition (de 0 à 48 heures après). Plus on tarde, plus l'efficacité diminue. De plus, le traitement n'est pas efficace à 100%

OÙ ?

- Se rendre aux urgences, au service qui s'occupe du SIDA, le service des maladies infectieuses

COMMENT ?

- Evaluer le risque avec un médecin
- Multi-thérapie pendant 4 semaines
- Traitement pouvant être lourd, avec des risques d'effets indésirables
- Prise de sang au bout d'1 mois, puis suivi pendant 3 mois pour s'assurer de l'absence de contamination

NUMÉROS UTILES

● SOS Hépatites

03 25 06 12 12

www.soshepatites.org

● Drogues Info Service

0 800 231 313

(gratuit depuis un fixe)

01 70 231 313

(depuis un portable au prix d'une communication ordinaire)

● Aides

0 820 160 120

www.aides.org

(0,12 €/min)

● Ecoute Alcool

0811 91 30 30

Cette plaquette a été réalisée par Aides 35, avec le soutien du Laboratoire Roche.



HÉPATITE B HÉPATITE C V.I.H

B01
B/45726

- Mode de transmission
- Dépistage
 - Traitement
 - Suivi



HÉPATITE B

SE TRANSMET PAR LES SECRECTIONS SEXUELLES ET LE SANG (PARFOIS SALIVE) :

- Relations sexuelles non protégées + + +
- Partage du matériel de drogues (seringues, eau, cotons, cuillères, pailles, stérécups...)
- Tatouages, piercings, acupuncture... lorsque réalisés avec matériel non stérilisé (contact avec du sang contaminé)
- Partage d'objets en contact avec du sang (rasoirs, brosse à dents...)
- Transmission de la mère à l'enfant (grossesse, allaitement...)
- Salive (très rare, seulement lors de la phase aiguë d'infection avec «baiser profond»)

MODES DE TRANSMISSIONS

DÉPISTAGE

- Demander dépistage hépatite C et VIH en même temps (soit au CDAG, soit auprès de votre médecin)

TRAITEMENT

- Soit 1 injection d'interféron pégylé/semaine pendant 48 semaines
- Soit médicaments oraux au long cours
- Traitement d'urgence : injection de sérum dans les 24 heures suivant l'exposition au virus et vaccination contre l'hépatite B

SUIVI

- Prise de sang au moins 2 fois/an (transaminases)
- Fibrotest : pas encore validé pour l'hépatite B (prise de sang pour évaluer les lésions du foie : la fibrose)
- Fibroscan : pas encore validé pour l'hépatite B (sorte d'échographie du foie)
- Biopsie du foie (acte médical utile pour évaluer les lésions, la fibrose, et décider d'un traitement)
- Vaccin disponible et remboursé

HÉPATITE



SE TRANSMET PAR LE SANG :

- Partage du matériel de drogues (seringues, eau, cotons, cuillères, pailles, stérécups...)
- Tatouages, piercings, acupuncture... lorsque réalisés avec matériel non stérilisé (contact avec du sang contaminé)
- Partage d'objets en contact avec du sang (rasoirs, brosse à dents...)
- Transmission de la mère à l'enfant (grossesse)
- Allaitement non contre indiqué mais risque possible si lésions sur le sein
- Risque sexuel quasiment nul mais possible lors des règles et pratiques sexuelles hard (car contact avec du sang), avec infection VIH ou une autre IST (syphilis...)

MODES DE TRANSMISSIONS

DÉPISTAGE

- Dépistage 3 mois après une prise de risque
- Demander dépistage hépatite B et VIH en même temps (soit au CDAG, soit auprès de votre médecin)

TRAITEMENT

- Bi-thérapie : 1 injection d'interféron pégylé par semaine associée à des comprimés de ribavirine tous les jours pendant 6 mois à 1 an
- Pas de traitement d'urgence mais traitement à envisager dans les 6 premiers mois de contamination (phase aiguë), car plus efficace

SUIVI

- Prise de sang 1 fois/an (transaminases)
- Fibrotest dans certaines situations (prise de sang pour évaluer la gravité des lésions du foie : la fibrose)
- Fibroscan dans certaines situations (sorte d'échographie du foie pour évaluer la fibrose)
- Biopsie du foie parfois nécessaire (acte médical utile pour évaluer la fibrose et dans certains cas décider d'un traitement)
- Pas de vaccin préventif

HÉPATITE



V.I.H.

MODES DE TRANSMISSIONS

- ### SE TRANSMET PAR LES SECRECTIONS SEXUELLES ET LE SANG :
- Pas de risques avec le partage d'objets (en l'absence de sang)
 - Relations sexuelles non protégées + + +
 - Partage matériel en contact avec du sang (seringues, cotons, eau, cuillères, pailles, stérécups...) : transmission possible si partage immédiat du matériel
 - Tatouages, piercings, acupuncture : transmission possible si réutilisation immédiate du matériel
 - Transmission de la mère à l'enfant (grossesse, allaitement...)

DÉPISTAGE

- Dépistage fiable à 100% (3 mois après la prise de risque)
- Demander dépistage hépatites C et B en même temps (soit au CDAG, soit auprès de votre médecin)

TRAITEMENT

- Multi-thérapie au long cours
- Traitement d'urgence disponible (voir verso)

SUIVI

- RDV tous les 4 mois pour une prise de sang et une consultation
- Pas de vaccin préventif

