



BCN

checkpoint

HOMES · SEXUALITAT · SALUT

Profilaxis pre-exposición frente al VIH (PrEP)

Las iniciativas de BCN Checkpoint


Ferran Pujol

Projecte dels NOMS-Hispanosida

VII Jornada de Enfermedades Emergentes / COMB

Barcelona, 13 de junio de 2017

Los diagnósticos de VIH entre los HSH en Europa han incrementado un 44% en el periodo 2005-2014



Los diagnósticos de VIH entre los HSH en Catalunya han incrementado un 129% (2001-2013), llegando al 82% en la ciudad de Barcelona

Figura 1.20. Evolució dels diagnòstics de VIH segons els grups de transmissió. Registre de VIH i sida de Catalunya, 2001-2013





Figura 1.28. Evolució anual dels diagnòstics nous d'infecció pel VIH segons el sexe i el grup de transmissió. Barcelona, 2001-2013



La Cohorte Barcelona Checkpoint

(Enero 2009 – Diciembre 2015)


16.216,4 personas-año de seguimiento

379 infecciones VIH

Incidencia VIH: 2,34/100 personas-año
(95% CI: 2,11 – 2,58)

Población general: incidencia = 0,02%


Figura 12. Estimacions de la incidència del VIH en la població general entre 15 i 49 anys.
Catalunya, 2003-2011



BCN Checkpoint (desde 2006)



- **BCN Checkpoint** fue creado en 2006 por la ONG **Projecte dels NOMS-Hispanosida**
- **BCN Checkpoint** atiende entre 50 y 70 usuarios al día
- BCN Checkpoint fue pionero en Europa en el uso de **pruebas rápidas del VIH** en centros comunitarios
- El **modelo de intervención comunitaria** en diagnóstico del VIH en HSH desarrollado por BCN Checkpoint está recomendado por la **OMS** y el **ECDC** y se ha replicado por toda Europa



Servicios de BCN Checkpoint

Pruebas rápidas detección
VIH / Sífilis / VHC

Pruebas de clamidia y
gonorrea


Vacunación VHA / VHB

Counselling y atención
psicológica entre iguales


Linkage to care

Investigación comunitaria


Detección VIH BCN Checkpoint




Resultados



Impacto diagnóstico en Catalunya



Linkage to Care



Resultados VIH BCN Checkpoint (2006-2016)

43.493

Pruebas realizadas

1.207

Casos de VIH
diagnosticados

98%

Casos con derivación
sanitaria efectiva

Campaña diagnóstico precoz (2014)



La prueba del
VIH


Si los hombres gais nos hacemos la prueba del VIH cada tres meses, conseguiremos proteger nuestra salud y reducir las nuevas infecciones en nuestro colectivo.

¡Cada 3 meses!

bcn checkpoint

Evolución del diagnóstico precoz en BCN Checkpoint

Infecciones de menos de 3 meses



Detección de infecciones agudas

GeneXpert® Testing in Non-Lab Setting




Valoración diagnósticos tardíos


Alere Prima™ Point-of-care CD4 test



Diagnóstico temprano + Linkage to Care rápido + Tratamiento



Diagnóstico temprano + Linkage to Care rápido + Tratamiento



Necesitamos PrEP ¡AHORA!



The time for debate on the effectiveness of PrEP is over.

Información y concienciación de la comunidad



PrEP arémonos: La profilaxis preexposición en la prevención del VIH en las poblaciones clave
Una visión desde la comunidad
(Sala 1)

Moderador:

- Ferran Pujol (Projecte dels NOMS-Hispanosida, Barcelona)

Participantes:

Pep Coll (Fundació Lluita contra la Sida, Barcelona)

Giulio Maria Corbelli (EATG-AVAC)

Diego García (Adhara, Sevilla)

Jorge Garrido (Apoyo Positivo, Madrid)

Michael Meulbroek (Projecte dels NOMS-Hispanosida, Barcelona)

Información y concienciación de la comunidad



Plataforma Gais Contra el VIH (noviembre 2015)

Colectivos gays critican la inacción de Salud en la lucha contra el VIH

- La Plataforma Gais contra el VIH anuncia movilizaciones y protestas por la "falta de voluntad política" para combatir la enfermedad
- [Vigias del VIH en el colectivo gay](#)

JESSICA MOUZO QUINTÁNS | Barcelona | 27 NOV 2015 - 00:20 CET



Archivado en: Día mundial contra el Sida | Días mundiales | Cataluña | VIH SIDA | Enfermedades infecciosas | ETS | Enfermedades | Medicina | Eventos | España | Salud



El doctor de BCN Checkpoint, Pep Coll atiende a un usuario del centro / CONSUELO BAUTISTA

EL PAÍS



Mobilización Día Mundial del Sida 2015



Grupo de trabajo sobre la PrEP (Diciembre 2015)

SALUD - ENFERMEDADES

Catalunya crea un grupo de expertos para estudiar implantar la píldora que previene el VIH

POR EUROPA PRESS

BARCELONA | 06/03/2016 - 11:26



Catalunya crea un grupo de expertos para estudiar implantar la pildora que previene el VIH BARCELONA | EUROPA PRESS

Participación en las recomendaciones de GeSIDA (Julio 2016)

Recomendaciones sobre Profilaxis Pre-Exposición en adultos para la Prevención de la Infección por VIH en España



- *La PrEP supone una oportunidad de prevención para las personas en riesgo que no utilizan preservativos*
- *Lejos de suponer un problema, la incidencia de otras ITS podrían controlarse mejor con las medidas de vigilancia que acompañan a la PrEP*
- *La PrEP puede tener un impacto psicológico beneficioso al mejorar las condiciones de las relaciones sexuales y reducir el miedo a la infección*

Activismo, información y movilización (Pride 2016)



Activismo, información y movilización (Circuit 2016)



Mobilización Día Mundial del Sida 2016

GAIS CONTRA EL VIH

Generalitat, Ajuntament:
Quant val la salut
dels gais i de les
dones transsexuals?



PrEP JA!

Concentració Dia Mundial de la Sida
Dijous 1 de desembre a les 9 del matí
Plaça Sant Jaume – Barcelona

Projecte dels NOMS
hispanosida BCN
checkpoint
HOMES · SEXUALITAT · SALUT afirmat A+ VIOLETA PROGRESS MAS Adhara Unió de
personas
transsexuals

GAIS CONTRA EL VIH

Generalitat, Ajuntament:
800 noves
infeccions cada
any. Vergonya!



PrEP JA!

Concentració Dia Mundial de la Sida
Dijous 1 de desembre a les 9 del matí
Plaça Sant Jaume – Barcelona

Projecte dels NOMS
hispanosida BCN
checkpoint
HOMES · SEXUALITAT · SALUT afirmat A+ VIOLETA PROGRESS MAS Adhara Unió de
personas
transsexuals

Mobilización Día Mundial del Sida 2016



Campañas en las redes sociales



EXIGE LA PREP

¡JUNTOS PARAREMOS EL VIH!

EXIGE ACCESO A LA PrEP: La Profilaxis Pre-exposición (PrEP) reduce en más de un 99% la posibilidad de infectarse con el VIH. A pesar de estar aprobada en Europa y recomendada por todos los expertos, aquí todavía no es accesible. Exige a los responsables sanitarios la implementación inmediata de la PrEP para detener las 800 nuevas infecciones que se diagnostican cada año en Catalunya (unas 4.000 en todo el estado).

BCN checkpoint
HOMBRES · SEXUALIDAD · SALUD



93 318 20 56
BCNCHECKPOINT.COM
COMTE BORRELL 164-166 (METRO URGELL) 08015 BARCELONA

Generalitat de Catalunya, Barcelona, Diputació de Barcelona, MAC AIDS FUND, PrEP, GEP, shangay, CASCARA amarga, GAY

Campañas en las redes sociales



Protesta Congreso Seisida (Marzo 2017)



Aprobación del Comité de Bioética de España (Marzo 2017)



≡ EL PAÍS

ESPAÑA

ANDALUCÍA CATALUÑA C. VALENCIANA GALICIA MADRID PAÍS VASCO MÁS COMUNIDADES TITULARES »

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES

El Comité de Bioética aconseja dar gratis la pastilla que previene el VIH

El medicamento se daría a personas que van a mantener una relación sexual de riesgo



EMILIO DE BENITO 

Madrid - 20 MAR 2017 - 13:29 CET



BCN PrEP·Point



BCN PrEP·Point (en construcción)



BCN PrEP·Point



(Apertura prevista: Septiembre 2017)

- Información / Asesoramiento
- Estudios clínicos y de factibilidad
- Seguimiento y reducción de riesgos en uso informal
- Dispensación PrEP (Implementación)
- Investigación comunitaria

Estudios sobre la PrEP



- N= 400 HSH y mujeres transexuales
- Seguimiento: 52 semanas
- Visitas: cada 12 semanas
- Cribados de ITS
- Truvada® diaria

Todavía sin previsión de inicio

Solamente en 2/3 ciudades en todo el Estado

Barcelona: Drassanes y BCN PrEP·Point

Estudios sobre la PrEP



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

- Beca Investigación PERIS (Pla estratègic de recerca i innovació en salut)
- N= 35 HSH y mujeres transexuales
- Seguimiento: 144 semanas (98 con tratamiento)
- Visitas: cada 12 semanas
- Cribado de ITS
- Truvada® diaria


Aprobado pero todavía sin implementación

Estudios sobre la PrEP



- A Phase 3, Randomized, Double-blind Study to Evaluate the Safety and Efficacy of Emtricitabine and Tenofovir Alafenamide (F/TAF) Fixed-Dose Combination Once Daily for Pre-Exposure Prophylaxis in Men and Transgender Women Who Have Sex With Men and Are At Risk of HIV-1 Infection
- N= 5.000
- Inclusion Criteria:
 - MSM and TGW (male at birth) who have at least one of the following:
 - Condomless anal intercourse with at least two unique male partners in the past 12 weeks (partners must be either HIV-infected or of unknown HIV status)
 - Documented history of syphilis in the past 24 weeks
 - Documented history of rectal gonorrhea or chlamydia in the past 24 weeks
 - Adequate renal function
 - Adequate liver and hematologic function

Acceso a la PrEP en Europa



- Noruega
- Luxemburgo
- Bélgica
- Francia
- Portugal
- Escocia
- Reino Unido
- Irlanda
- Holanda
- Suiza
- Austria

Uso informal de la PrEP




El mercado negro de las pastillas antisida

Mientras en EEUU está disponible desde 2012, en Europa no es legal adquirir el fármaco que evita la transmisión del VIH (PrEP).

ELESPANOL.COM | PER AINHOA IRIBERRI


Uso informal de la PrEP

Hornet survey on PrEP



Hornet survey respondents


8543 persons responded between 23 – 25 April



Uso informal de la PrEP

Are you currently taking PrEP?

n= 8048 (excludes HIV-positive respondents)



Uso informal de la PrEP (Encuesta Flash PrEP in Europe)

CONCLUSIONES

Dependiendo del método de inscripción, **los perfiles de los encuestados variaron mucho.** Este hecho ha influido fuertemente en los resultados de la encuesta.

El nivel de conocimiento dependía mayoritariamente de los perfiles de los encuestados; entre el 37% y el 77% sabían lo que era PrEP antes de hacer la encuesta; **una gran mayoría de los participantes tenían un conocimiento correcto de la PrEP.**

El interés en PrEP fue relativamente alto entre los encuestados; no obstante, el interés era menor entre las mujeres.

Según los datos **PrEP respondería a las necesidades de prevención** de un gran número de encuestados.

La mayoría de los encuestados opinaron que **PrEP debería ser entregado en el marco de un paquete de prevención completo** (incluyendo apoyo de colegas).

Una gran mayoría de encuestados opinaron que **PrEP debería ser o gratis, o al menos cubierto en parte por la seguridad social.**

A la mayoría de los encuestados les gustaría que **PrEP se entregara en lugares enmarcados en la comunidad, ya sea en centros comunitarios o en consultas de médicos de familia.**

Un significativo número de encuestados ya están tomando PrEP de manera informal (extraoficial), a menudo sin un seguimiento médico adecuado.

Uso informal de la PrEP en España

farmacosalud.com

Portal de referencia en avances y tratamientos médicos

Buscar por palabra clave



Usuario

Contraseña

Entrar

Farmacosalud

Especialidades

Biotecnología

Especiales

Consejos médicos

Asociaciones de pacientes

Área profesional

Especialidades / Enfermedades del siglo XXI / Infecciosas



[← Volver atrás](#)

Fecha de publicación: 6 junio, 2017 / Fecha de Modificación: 2 junio, 2017

Unas 1.500 personas logran usar la PrEP en España a pesar de no estar aprobada

La forma de conseguir los fármacos de la profilaxis pre-exposición (método preventivo frente al VIH) “es por vía no oficial, o sea, comprándolos en internet, obteniéndolos del extranjero, o utilizando medicaciones de otros pacientes, lo cual tiene muchos peligros”, revela el nuevo presidente de GeSIDA, el Dr. Pérez Molina

Redacción Farmacosalud.com

Uno de los objetivos del nuevo presidente de GeSIDA [Grupo de Estudio del Sida de la SEIMC (Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica)], el doctor José Antonio Pérez Molina, del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, es mejorar la estrategia preventiva frente al

Enfermedades del siglo XXI

Alergias

Angiología y cirugía vascula...

Cardiovascular

Hematología y hemoterapia

Infecciosas



Uso informal de la PrEP en España

www.quieroprepya.eu



SeguiPrEP: Programa de apoyo y reducción de daños

Establecimiento de un servicio interdisciplinario de seguimiento farmacoterapéutico en hombres que tienen sexo con hombres y mujeres transexuales que son usuarios informales de la profilaxis preexposición contra el VIH

- Controlar el VIH y otras ITS
- Evaluar el historial farmacoterapéutico, la medicación prescrita concurrente, así como el uso de otras sustancias (drogas psicotrópicas, anabolizantes, etc.).
- Determinar la existencia de problemas relacionados con los medicamentos (PRM), que podrían acabar desarrollando resultados negativos asociados a la medicación (RNM)
- Controlar la función renal
- Evaluar la adherencia de los usuarios de PrEP informal

Agradecimientos

