





Perfil de las mujeres transgénero diagnosticadas de infección por el VIH en el una clínica de ITS/VIH de Madrid, 2014- 2019

Autores: Oskar Ayerdi, Mar Vera, Teresa Puerta, Petunia Clavo, Juan Ballesteros, Eva Orviz, Begoña Baza, Mónica García, Estefanía Hurtado, Montserrat Raposo, Carmen Rodríguez y Jorge Del Romero. Centro Sanitario Sandoval, Hospital Clínico San Carlos, IdISSC, Madrid

Introducción y objetivos: Según la OMS, las mujeres transgénero representan a uno de los grupos más afectados frente a la infección por el VIH. No obstante, los datos específicos en estas personas transgénero son limitados. El objetivo de este trabajo fue analizar las características sociodemográficas, clínicas y conductuales de las mujeres transgénero con un nuevo diagnóstico del VIH.

Material y métodos: Entre 2014 y 2019 se diagnosticaron 41 nuevos casos de la infección por el VIH en mujeres transgénero en un Centro de ITS/VIH de Madrid. A todas ellas, se les pasó un cuestionario donde se recogían características sociodemográficas, clínicas y conductuales.



Resultados:




Trabajadoras del Sexo (n=41)




Vía de transmisión del VIH: Sexual en el 100%




Consumo de sustancias recreativas (n=41)




Antecedentes de ITS (n=41)




ITS Concomitantes al Dx del VIH (n=41)




Antecedentes de ITS según infección (n=25)



ITS concomitantes al Dx del VIH (nº de casos según cada infección=25)



Recuento de linfocitos T CD4+ al Dx del VIH (n=32)



Conclusiones:

Es necesario implementar todas las medidas de prevención frente al VIH/ITS entre las mujeres transexuales, especialmente de origen latinoamericano y las que ejercen la prostitución. Conocer su perfil sociodemográfico, clínico y conductual es fundamental diseñar programas de prevención adaptados.