

**F\*CK?**

**"Yo follo  
siempre  
con **condón**,  
no tengo  
de que  
**preocuparme**"**

**#mito**

**apoy** 

**F\*CK?**

**¿También la chupas  
con condón?**

La transmisión a través  
de la **mucosa** de la  
garganta de algunas  
de las ITS es muy  
frecuente, siendo más  
difícil de **diagnosticar**  
ya que suelen ser  
**asintomáticas**

**apoy** 😊

**F\*CK?**

“Si a mi no  
me **pica**  
nada, para  
que me voy  
a hacer  
la **prueba**”

**#mito**

**apoy** 



# F\*CK?

El **79%** de las infecciones de transmisión sexual (**ITS**) detectadas durante el seguimiento de la **PrEP** serían **asintomáticas**



**F\*CK?**

“No ha pasado ni un **mes**, aún no puedo hacerme la **prueba**”

**#mito**

**apoy** 😊

# F\*CK?

El **período ventana** es el tiempo que tiene que pasar desde que se mantiene una relación con posible transmisión para que las pruebas lo detecten.


En Apoyo Positivo disponemos de una prueba **PCR** para **Gonorrea y Clamidia** con entre 3 y 5 días de período ventana

apoy😊

**F\*CK?**

"Yo ya tuve  
**Sífilis**, no  
la puedo  
tener  
**otra vez**"


**#mito**



**apoy** 😊

# F\*CK?

Tener Sífilis **NO** es como una **vacuna**, puedes tenerla otra vez en el futuro, lo único **que** ya no podrás hacerte son las **pruebas rápidas de anticuerpos**



apoy 

**F\*CK?**



Para **una** vez  
que **follo...**

**#mito**

**apoy** 😊

# F\*CK?

El número de **parejas sexuales** solo debe influir en la periodicidad para hacerte la prueba, con una relación es suficiente para que haya **transmisión** de ITS

apoy 