

لا مزيد من الشكوك حول فيروس نقص المناعة البشرية (VIH)

استشارة شبكة الكيانات التابعة ل CESIDA التي تجري أخبارات سريعة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية (VIH) و حل شكوك



cesida.org



لا مزيد من الشكوك حول فيروس نقص المناعة البشرية (VIH)

تعزيز الصحة والوقاية من فيروس نقص VIH (المناعة البشرية) وغيرها من الأمراض (ITS) المنقلة بالاتصال الجنسي بين المهاجرين

يمكن الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية (VIH)

أثناء تعاطي المخدرات بالحقن:

لا تعيد استخدام أو مشاركة الحقن أو الماء أو معدات تحضير المخدرات.

في كل مرة تستخدم إبر ومحاقن جديدة يتم الحصول عليها من مصدر موثوق.

ما هو فيروس نقص المناعة البشرية (VIH) والإيدز؟

فيروس نقص المناعة البشرية (VIH) هو فيروس يدمّر دفاعاتنا عندما يدخل أجسامنا، مما يسهل الإصابة بأمراض أخرى.

+++++

إيدز هو مرحلة متقدمة من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (VIH) تحدث بعد سنوات من الإصابة، أو عندما لا يتم العلاج، أو عندما يكون العلاج قد فشل.

كيف ينتقل فيروس نقص المناعة البشري (VIH)؟

عن طريق الجنس:

الاختراق الشرجي أو المهبلي بدون وافي ذكري، أو بسبب الاستخدام غير السليم له.

في الجنس الفموي، يزداد خطر انتقال العدوى إذا كانت هناك آفات في العشاء المخاطي الفموي للرماس.


إن الإصابة بعدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي (حتى بدون أعراض) تزيد من خطر انتقال فيروس نقص المناعة البشرية (VIH) أو الإصابة به أثناء ممارسة الجنس.

عن طريق الدم:

من خلال مشاركة الحقن أو الإبر أو أي أدوات قد تقطع أو تؤخر وتلامس مع الدم المصاب.

الانتقال العمودي:

من الأم إلى طفلها أثناء الحمل أو الولادة أو الرضاعة الطبيعية إذا لم تلتقي الأم العلاج المضاد للفيروسات العكوسية.



غير قابل للكشف = غير قابل للانتقال

الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية (VIH)، الذين يتلقون العلاج المضاد للفيروسات القهقرية ولديهم حمل فيروسي لا يمكن اكتشافه في دمائهم، لا ينقلون فيروس نقص المناعة البشرية (VIH) في علاقاتهم الجنسية.



أثناء ممارسة الجنس:

استخدام الواقي الذكري أو الأنثوي في العلاقات الجنسية. إذا تم استخدامهم بشكل صحيح ولم يتم كسرهم، فإن الواقي الذكري والأنثوي هم أدوات مثبتة لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية (VIH) ومعظم الأمراض المنقولة جنسياً

تجنب القذف في الفم.

في الاختراق، من المستحسن استخدام مواد التشحيم القابلة للذوبان في الماء (تقليل مخاطر تكسر الواقي الذكري وتسييل الاختراق)، ولا تستخدم أبداً مواد التشحيم القائمة على الزيوت أو الكريمات.

منع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل/ة:

بفضل العلاج المضاد للفيروسات القهقرية، فإن الأم المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (VIH) والتي تتلقى العلاج ولديها حمل فيروسي لا يمكن اكتشافه لن تنقل الفيروس إلى طفلها، سواء أثناء الحمل أو أثناء الولادة.

PEP و PrEP ليسا بآبي حال من الأحوال بديلًا عن الاستخدام المنتظم للواقي الذكري أو طرق الوقاية الأخرى، لأنهما لا يمنعان الأمراض الأخرى المنقولة جنسياً.

PrEP (الوقاية قبل التعرض): طريقة الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية (VIH) للأشخاص الذين يتعرضون لخطر الإصابة به. PrEP هي حبة يتم تناولها عن طريق الفم كل يوم وهي فعالة للغاية، بشرط تناولها بشكل صحيح.

PEP (الوقاية بعد التعرض): الأدوية التي يتم تناولها بعد التعرض المحتمل لفيروس نقص المناعة البشرية (VIH) للوقاية من العدوى. يجب استخدامه فقط في حالات الطوارئ وأخذها في غضون 72 ساعة بعد التعرض المحتمل.



Subvencionado por:



الأمراض المنقولة جنسياً

لا تتردد، اخرج من شكوكك
لا تتردد، اخرج من شكوكك



كيف أعرف ما إذا كنت مصاباً بفيروس نقص المناعة البشرية (VIH)؟

الطريقة الوحيدة لمعرفة ذلك هي إجراء اختبار لفيروس نقص المناعة البشرية (VIH) عن طريق اختبار معين (لا يتم اكتشافه في اختبار روتيني) أو اختبار سريع لللعاب أو لدم.

من وقت حدوث العدوى حتى توليد الأجسام المضادة التي يتم اكتشافها في الاختبار، يمكن أن تستغرق ما يصل إلى 3 أشهر. من المهم جداً معرفة متى كانت لدينا آخر ممارسة محفوظة بالمخاطر لمعرفة ما إذا كانت النتيجة موثوقة أم يجب تكرارها.

الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي (ITS) هي عدوٍ تسبّبها البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات التي تنتقل في معظم الحالات أثناء ممارسة الجنس، وخاصة في الإيلاج المهبلي والجنس الشرجي والفموي (لامسسة الفم للقضيب أو الفرج أو الشرج).

ترتبط الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي (ITS) ارتباطاً وثيقاً بالعدوى بفيروس نقص المناعة البشرية (VIH) من خلال الانتقال المشترك، ولكن أيضاً لأنها تزيد من خطر انتقال فيروس نقص المناعة البشرية (VIH) أو الإصابة به.

قد يكون بعضها مرئياً، مما ينبع عنه أعراض، مثل القرحة والقرح (الجرح المفتوحة) والإفرازات أو القيح والثاليل أو الأورام القوية والبعض الآخر قد لا تظهر عليه أعراض، لذلك على ما يبدو، قد تختفي في غياب العلاج. ومع ذلك، هذا لا يعني أنها شففت. يتم علاج معظمها ومنعها بسهولة، ولكن إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح، فقد يكون لها عواقب مهمة.

ولذلك من المهم الكشف عن الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي في شبكة المراكز الصحية المعتمدة والمراكز المجتمعية.

أكثر الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي (ITS) شيوعاً:

- فيروس الورم الحليمي البشري – VPH
- المتاثر أو الكلميديا
- مرض السيلان
- مرض الزهري
- هربس الأعضاء التناسلية
- التهاب الكبد A و B و سي



قم بإجراء الإختبار!

وغيره من (VIH) تعزيز الصحة والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية مع المهاجرين (ITS) الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي

آمنة. مجانية. سرية

أين يمكنني إجراء فحص فيروس نقص المناعة البشرية (VIH)؟

وبنطغي دائماً أن يكون اختبار فيروس نقص المناعة البشرية (VIH) طوعياً وسريعاً وعken إجراؤه مجاناً في المراكز الصحية التابعة لشبكة الصحة العامة والمنظمات غير الحكومية. يمكن أيضاً إجراؤه في مختبرات التحليل السريري الخاصة وبعض الصيدليات.



في بعض مراكز الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي (ITS) والمنظمات غير الحكومية والصيدليات لا تقدم طلبات للحصول على البطاقة الصحية.

ستسمح لك معرفة ما إذا كنت مصاباً بفيروس نقص المناعة البشرية (VIH) بالاستفادة في أقرب وقت (VIH) ممكن من المتابعة الطبية والحصول على علاج فعال يمنع حدوث مضاعفات في صحتك ويحسن نوعية حياتك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك حماية نفسك من إعادة الإصابة وتجنب نقل فيروس نقص المناعة إلى الآخرين (VIH) البشرية.

متى يجب أن أخضع لفحص فيروس نقص المناعة البشرية (VIH)؟

إذا كان لديك شريك مستقر وتريد التوقف عن استخدام الواقي الذكري معه.

إذا كنت قد شاركت مواد لحقن المخدرات (حقن، إبر، ملاعق، مرشحات...) أو استخدمت مواد غير معقمة لنفقوب في الجلد أو الأغشية المخاطية (أقراط، ثقب، وشم...).

إذا لم يتم اختبارك من قبل ومارست الجنس بدون واهي ذكري.

إذا كنت تعتقد أنك حامل أو تحظط لتكون كذلك.

إذا كنت مصاباً بأي عدوٍ تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي أو السل أو التهاب الكبد الفيروسي.



الأعراض التي تشير بصابتك بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي (ITS):

- القرح أو الثاليل أو البثور بالقرب من الأعضاء التناسلية أو فتحة الشرج أو الفم.
- حرق أو حكة حول الأعضاء التناسلية.
- الاحتراق عند التبول أو التغوط.
- تورم العقد على شكل كتلة قد تكون أو لا تكون مؤلمة في الفخذ.
- إفرازات مهبلية سميكه أو كريهة الرائحة أو حكة أو ألم عند التبول أو ممارسة الجنس لدى النساء.
- تفريغ (شيء بالصديق) من مجرى البول أو الألم أو الحرق عند الرجال.

¿TIENES DUDAS SOBRE EL VIH Y SIDA?

En este folleto te ayudaremos a resolver todas las preguntas que tengas sobre el VIH, Sida y otras ITS.



QUÉ ES EL VIH Y EL SIDA

El **VIH** es un virus que cuando entra en nuestro cuerpo destruye las defensas, por lo que es más fácil contraer otras enfermedades.

+++++

El **Sida** es un estado avanzado de la infección por el VIH que tiene lugar años después de la infección, cuando no se toma tratamiento o cuando este ha fallado.



EL VIH NO SE TRANSMITE POR

- Los besos, las caricias, darse la mano, tocarse o masturbar a tu pareja.
- Las lágrimas, el sudor, la saliva, la tos o los estornudos.
- Convivir o trabajar con personas que tengan el virus.
- Compartir objetos de uso común, como ropa o alimentos, o espacios, como la ducha o WC, piscinas, instalaciones deportivas o de ocio, residencias, colegios o lugares públicos.
- Mordeduras o picaduras de animales, como los mosquitos.
- Donar o recibir sangre en países donde el control es adecuado.

NO+ DUDAS FRENTE AL VIH

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y
PREVENCIÓN DEL VIH Y OTRAS ITS
CON PERSONAS MIGRANTES

¿CÓMO SE PUEDE PREVENIR EL VIH?

DURANTE EL CONSUMO DE DROGAS INYECTABLES:

- No reutilizar ni compartir jeringuillas, agua o equipos para la preparación de drogas.
- Utilizar cada vez agujas y jeringuillas nuevas obtenidas de una fuente fiable.

DURANTE LAS RELACIONES SEXUALES:

- Usando preservativos masculinos o femeninos. Si se usan correctamente, los preservativos son herramientas de probada eficacia para prevenir la transmisión del VIH y la mayoría de infecciones de transmisión sexual.
- Evitando la eyaculación en la boca.
- En la penetración, es recomendable utilizar lubricantes solubles en agua (reducen el riesgo de roturas de los preservativos y facilitan la penetración), nunca lubricantes a base de aceite o cremas.

CÓMO SE TRANSMITE EL VIH

→ VÍA SEXUAL

Penetración anal o vaginal sin preservativo, o por un empleo incorrecto del mismo.

En el **sexo oral**, el riesgo de transmisión se incrementa si existen lesiones en la mucosa oral de la persona que lo practica.

Tener una **infección de transmisión sexual** (incluso sin síntomas) aumenta el riesgo de transmitir o contraer el VIH en una relación sexual.

→ VÍA SANGUÍNEA

Al **compartir jeringas**, agujas o cualquier instrumento que pueda cortar o pinchar y que haya estado en contacto con sangre infectada.

→ TRANSMISIÓN VERTICAL

De una madre a su bebé durante el **embarazo**, el **parto** o la **lactancia** si la madre no recibe tratamiento antirretroviral.



I=I INDETECTABLE = INTRANSMISIBLE

Las personas con el VIH que están en tratamiento antirretroviral y tienen una carga viral indetectable en sangre, **NO TRANSMITEN el VIH** en sus relaciones sexuales.



PREVENIR LA TRANSMISIÓN DE MADRE A HIJO/A:

- Gracias al tratamiento antirretroviral, una madre con el VIH que se encuentra en tratamiento y tiene una carga viral indetectable, no transmitirá el virus a su bebé, ni durante el embarazo, ni en el parto.

La **PREP** y la **PEP** no sustituyen en ningún caso el uso regular del preservativo u otros métodos de prevención, ya que no previenen otras infecciones de transmisión sexual.

PEP
PrEP

LA PREP (PROFILAXIS PREEXPOSICIÓN)

Método de **prevención del VIH** para las personas que no lo tienen, pero se encuentran en alto riesgo de contraerlo. La PrEP es una píldora que se toma de manera oral todos los días y es altamente eficaz, siempre que se tome correctamente.

LA PEP (PROFILAXIS POSEXPOSICIÓN)

Medicamentos que se toman después de una posible exposición al VIH para prevenir la infección. Debe emplearse solo en **situaciones de emergencia** y tomarse dentro de las 72 horas tras la posible exposición.



cesida@cesida.org

915.223.807

@cesida



Subvencionado por:



MINISTERIO
DE SANIDAD

SECRETARÍA DE ESTADO
DE SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL
DE SALUD PÚBLICA
DIVISIÓN DE CONTROL
DEL VIH, ITS, HEPATITIS VIRALES
Y TUBERCULOSIS

NO LO DUDES!
NO LO DUDES!

Cesida



HAZTE LA PRUEBA!

Consulta la red de entidades de Cesida que realizan la prueba rápida del VIH.

SEGURA. GRATUITA. CONFIDENCIAL

Saber si tienes el VIH te permitirá beneficiarte lo antes posible de un seguimiento médico y acceder a un tratamiento eficaz que evitará complicaciones en tu salud y mejorará tu calidad de vida.

Además, podrás protegerte de reinfecciones y evitar transmitir el VIH a otras personas.

CUÁNDO DEBERÍA HACERME LA PRUEBA DEL VIH

- Si piensas que estás embarazada o planeas estarlo.
- Si has tenido alguna infección de transmisión sexual, tuberculosis o hepatitis viral.
- Si tienes una pareja estable y quieres dejar de usar el preservativo con ella.
- Si has compartido material para inyectarte drogas (jeringuillas, agujas...) o has usado material sin esterilizar para perforaciones en piel o mucosas (pendientes, tatuajes...).
- Si nunca te has realizado la prueba con anterioridad y has tenido relaciones sexuales sin preservativo.



CÓMO PUEDO SABER SI TENGO EL VIH

La única manera de saberlo es haciéndose la **PRUEBA DEL VIH** mediante un análisis específico (no se detecta en un análisis rutinario) o una prueba rápida de saliva o sangre.

Desde que se produce la infección, hasta que se generan los anticuerpos que se detectan en la prueba, pueden pasar hasta **3 meses**. Es muy importante saber cuándo tuvimos la última práctica de riesgo para saber si el resultado es fiable o conviene repetirla.

DÓNDE PUEDO HACERME LA PRUEBA DEL VIH

La **prueba del VIH** debe ser siempre voluntaria y confidencial y se puede realizar de forma **gratuita** en los centros sanitarios de la red pública sanitaria y en las ONG.



También se puede hacer en laboratorios de análisis clínicos privados y algunas farmacias.



En algunos centros de ITS, en las ONG y en las farmacias no se solicita la tarjeta sanitaria.

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL ITS

Las Infecciones de transmisión sexual (ITS) son infecciones producidas por bacterias, virus, hongos y parásitos que en la mayoría de los casos se transmiten durante las relaciones sexuales, especialmente en la penetración vaginal, anal y el sexo oral (contacto de la boca con pene, vulva o ano).

Las ITS están muy relacionadas con la infección por el VIH por compartir vía de transmisión, pero también porque aumentan el riesgo de transmitir o de adquirir el VIH.

Algunas pueden ser visibles, produciendo síntomas, como úlceras, llagas (heridas abiertas), secreciones o pus, verrugas o condilomas y otras pueden no presentar sintomatología, por lo que aparentemente, pueden desaparecer en ausencia de tratamiento. Sin embargo, eso no quiere decir que se hayan curado. La mayoría se curan y se previenen de forma sencilla, pero, si no se tratan adecuadamente, pueden tener consecuencias importantes.

Por ello, es importante realizarse la **prueba de las infecciones de transmisión sexual** en la red de centros sanitarios y centros comunitarios autorizados.

ITS MÁS FRECUENTES

Virus del Papiloma Humano – VPH

Clamidia

Gonorrea

Sífilis

Herpes genital

Hepatitis A, B y C



SÍNTOMAS INDICATIVOS DE PADECER UNA ITS

- ⌚ Úlceras, ronchas, verrugas o ampollas cerca de los genitales, ano o boca.
- ⌚ Escozor o picor alrededor de los genitales.
- ⌚ Ardor al orinar o al defecar.
- ⌚ Ganglios inflamados en forma de un bulto que puede o no ser doloroso en las ingles
- ⌚ Secreción vaginal espesa o maloliente, escozor o dolor al orinar o con las relaciones sexuales, en las mujeres.
- ⌚ Secreción purulenta (con aspecto de pus) por la uretra, el dolor o escozor, en los hombres.

DOUTES SUR LE VIH ET SIDA ?

Ce dépliant t'aidera à répondre à toutes les questions que tu as sur le VIH, le SIDA et les autres IST.



QUE SONT LE VIH ET LE SIDA?

Le **VIH** est un virus. Quand il rentre dans l'organisme, il détruit les défenses de ce dernier, facilitant ainsi la contraction d'autres maladies.

+

+

+

+

+

+

Le **sida** constitue un stade avancé de l'infection par le VIH. Cet état survient des années après l'infection, lorsque le traitement n'est pas suivi ou a échoué.

VOIE SANGUINE

Partager des seringues, des aiguilles ou tout instrument pouvant couper ou piquer et ayant été en contact avec du sang infecté.

VOIE SEXUELLE



Pénétration anale ou vaginale sans préservatif, ou dans le cadre d'une utilisation incorrecte d'un préservatif.

Lors de rapports **sexuels oraux**, le risque de transmission est accru si la muqueuse buccale de la personne qui pratique le sexe oral présente des lésions.

Le fait d'avoir une **infection sexuellement transmissible (IST)**, même sans symptômes, augmente le risque de transmettre ou de contracter le VIH.

TRANSMISSION PÉRINATALE

D'une mère à son enfant au cours de la grossesse, de l'accouchement et de l'allaitement si elle ne reçoit pas de traitement antirétroviral.



cesida@cesida.org

915.223.807

@cesida



LE VIH NE SE TRANSMET PAS PAR

- Le fait d'embrasser, caresser, tenir la main, toucher ou masturber votre partenaire.
- Les larmes, la sueur, la salive, la toux ou les éternuements.
- La cohabitation ou le travail avec des personnes ayant le virus.
- Le partage d'objets d'usage commun comme des vêtements ou de la nourriture; ou des espaces comme des douches, des lavabos ou des toilettes, des piscines, des installations sportives ou de loisirs, des résidences, etc.
- Morsures ou piqûres d'animaux, de moustiques ou d'autres insectes.
- Le fait de donner ou de recevoir du sang dans les pays où le dépistage est adéquat.

I=I INDÉTECTABLE = INTRANSMISSIBLE

Les personnes avec le VIH, qui suivent un traitement antirétroviral et présentent une charge virale indéetectable dans le sang,

NE TRANSMETTENT PAS le VIH

lors de rapports sexuels.



PLUS DE DOUTES SUR LE VIH

PROMOTION DE LA SANTÉ ET PRÉVENTION DU VIH ET DES AUTRES IST AUPRÈS DES PERSONNES MIGRANTES

COMMENT PRÉVENIR LE VIH

LORS DE LA CONSOMMATION DE DROGUES INJECTABLES:

- Ne pas réutiliser ou partager les seringues, l'eau ou le matériel de préparation des drogues.
- Utiliser toujours des aiguilles et des seringues neuves provenant d'une source fiable.

LORS DE RAPPORTS SEXUELS:

- Utiliser des préservatifs externes et internes (aussi appelés masculins ou féminins) pendant les rapports sexuels. S'ils sont utilisés correctement et ne sont pas abimés, les préservatifs constituent des outils d'une efficacité démontrée pour prévenir la transmission du VIH et de la plupart des IST.
- Éviter les éjaculations dans la bouche.
- Pendant la pénétration, il est conseillé d'utiliser des lubrifiants hydrosolubles (ils réduisent le risque de rupture du préservatif et facilitent la pénétration), jamais de lubrifiants à base d'huile ou des crèmes.

PRÉVENIR LA TRANSMISSION MÈRE-ENFANT:

- Grâce au traitement antirétroviral, une mère avec le VIH sous traitement et dont la charge virale est indéetectable ne transmettra pas le virus à son bébé, que ce soit pendant la grossesse ou l'accouchement.

La **PREP** et la **PEP** ne remplacent en aucun cas l'utilisation régulière de préservatifs ou d'autres méthodes de prévention, car elles ne préviennent pas les autres IST.

LA PREP (PROPHYLAXIE PRÉ-EXPOSITION)

méthode de prévention du VIH destinée aux personnes présentant un risque élevé de contracter le virus. La PrEP consiste à prendre une pilule par voie orale tous les jours et s'avère particulièrement efficace, à condition d'être suivie correctement.

PEP
PrEP

LA PEP (PROPHYLAXIE POST-EXPOSITION)

Médicaments pris après une exposition possible au VIH pour prévenir l'infection. Il ne doit être utilisé qu'en cas d'urgence et pris dans les 72 heures suivant une exposition éventuelle.



Subventionné par:



MINISTERIO
DE SANIDAD

SERETARÍA DE ESTADO DE SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA
DIVISIÓN DE CONTROL DE VIH, ITS, HEPATITIS VIRALES Y TUBERCULOSIS

NE DOUTEZ PAS!
NE DOUTEZ PAS!



FAITES LE TEST!

Consultez le réseau d'entités de Cesida qui effectuent des tests rapides de dépistage du VIH et DISSIPEZ VOS DOUTES

SÛR. GRATUIT. CONFIDENTIEL.

Savoir si vous avez le VIH vous permettra de bénéficier au plus tôt d'un suivi médical et d'accéder à un traitement efficace qui préviendra les complications de santé et améliorera votre qualité de vie. Vous pouvez également vous protéger contre la réinfection et éviter de transmettre le VIH à d'autres personnes.

QUAND DOIS-JE FAIRE LE TEST DE DÉPISTAGE DU VIH ?

- ➔ Si vous avez eu une pratique à risque, n'attendez pas, rendez-vous dans votre centre de santé ou dans un autre centre au sein duquel vous pourrez faire un test de VIH et des autres IST. Les professionnels évalueront votre cas, vous testeront et vous conseilleront sur les démarches pour obtenir des soins médicaux.
- ➔ Si vous n'avez jamais été testé auparavant et que vous avez eu des rapports sexuels sans préservatif.
- ➔ Si vous pensez être enceinte ou si vous envisagez de l'être.
- ➔ Si vous avez eu une IST, une tuberculose ou une hépatite virale.
- ➔ Si vous avez un partenaire régulier et que vous voulez arrêter d'utiliser des préservatifs avec lui.



COMMENT SAVOIR SI J'AI LE VIH ?

La seule façon de le savoir est de faire un **TEST DE DÉPISTAGE DU VIH** par une analyse spécifique (il n'est pas détecté par une analyse de routine) ou un test rapide de salive ou sang.

Il peut s'écouler jusqu'à **trois mois** entre le moment de l'infection et la production des anticorps détectés par le test. Il est particulièrement important de savoir à quand remonte la dernière pratique à risque afin de savoir si le résultat du test est fiable ou si ce dernier doit être répété.

OÙ PUIS-JE FAIRE UN TEST DE DÉPISTAGE DU VIH?

Le **dépistage du VIH** doit toujours être volontaire et confidentiel et peut être effectué **gratuitement** dans les centres de santé publics et les ONG.



Il peut également être effectué dans des laboratoires cliniques privés et dans certaines pharmacies.



Certains centres d'IST, ONG et pharmacies ne demandent pas de carte de santé.

LES INFECTIONS IST SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES

Les infections sexuellement transmissibles (IST) correspondent à des infections causées par des bactéries, des virus, des champignons et des parasites qui, dans la plupart des cas, sont transmises lors de rapports sexuels, notamment au cours de la pénétration vaginale et anale et lors de rapports oraux.

Les IST sont étroitement liées à l'infection du VIH parce qu'elles ont un mode de transmission commun, mais aussi parce qu'elles augmentent le risque de transmettre ou de contracter le VIH.

Certaines peuvent être visibles et produire des symptômes, tels que des ulcères, des plaies (blessures ouvertes), des sécrétions ou du pus, des verrues ou des condylomes, et d'autres peuvent ne présenter aucun symptôme, de sorte qu'elles peuvent apparemment disparaître en l'absence de traitement. Toutefois, cela ne signifie pas qu'elles sont guéries. La plupart sont faciles à guérir et à prévenir, mais si elles ne sont pas traitées correctement, elles peuvent entraîner des conséquences importantes.

Il est donc important **de se faire dépister pour les IST** dans le réseau des centres de santé et des centres communautaires autorisés.

IST PLUS FRÉQUENTS

Papillomavirus humains – HPV

Chlamydia

Gonorrhée

Syphilis

Herpès génital

Hépatite A, B et C



SIGNES D'IST :

- ⌚ Lésions, éruptions, verrues ou cloques à proximité des organes génitaux, de l'anus ou de la bouche.
- ⌚ Brûlure ou démangeaisons autour des organes génitaux.
- ⌚ Brûlure pendant la miction ou la défécation.
- ⌚ Des ganglions gonflés sous la forme d'une bosse qui peut être douloureuse ou non dans l'aine.
- ⌚ Pertes vaginales épaisse ou malodorante, brûlure ou douleurs lors de la miction ou des rapports sexuels chez les femmes.
- ⌚ Écoulement purulent (ressemblant à du pus) de l'urètre, douleur ou brûlure, chez les hommes.

DO YOU HAVE DOUBTS ABOUT HIV AND AIDS?

In this brochure, we will help you answer all the questions you have about HIV, AIDS, and other STIs.



WHAT ARE HIV AND AIDS?

HIV is a virus. When HIV gets inside the body, it destroys the body's defences, making it easier to contract other diseases.

+

+

+

+

+

+

AIDS is the advanced stage of an HIV infection. It can occur years after the contraction of HIV, when there has been no treatment or it has failed.

HOW IS HIV TRANSMITTED?


→ **SEXUAL CONTACT:** Anal or vaginal penetration without using condoms or using them improperly.

During **oral sex**, the risk of transmission increases if there are lesions in the oral mucosa of the person who practices it.

Having a **sexually transmitted infection (STI)**, even without symptoms, increases the risk of transmitting or contracting HIV during sex.

→ **BLOOD**
When **sharing syringes**, needles or any other object that cuts or pricks and has been in contact with infected blood.

→ **PERINATAL TRANSMISSION**
From mother to her baby during pregnancy, delivery or **breastfeeding** if the mother is not taking antiretroviral treatment.



HIV IS NOT TRANSMITTED BY

- Kissing, caressing, shaking hands, touching or masturbating your partner.
- Tears, sweat, saliva, cough or sneezes.
- Living together or working with people with HIV.
- Sharing common items such as clothes and food; or common spaces, such as showers, toilets, swimming pools, sports and leisure centres or residences
- Bites or stings from animals and mosquitoes or other insects.
- Giving or receiving blood in countries where screening is adequate.

U=U UNDETECTABLE=UNTRANSMITTABLE

People with HIV who are on antiretroviral treatment and have an undetectable viral load in blood

DO NOT TRANSMIT HIV

during sex.



NO MORE DOUBTS ABOUT VIH

HEALTH PROMOTION AND PREVENTION OF HIV AND OTHER STIs WITH MIGRANT PEOPLE

HOW CAN HIV BE PREVENTED?

DURING INJECTION DRUG USE:

- Not reusing or sharing syringes, water or drug preparation equipment.
- Using new needles and syringes obtained from a reliable source every time.

DURING SEXUAL CONTACT:

- Using external or internal condoms (also known as male or female condoms) during sex. If used the right way and if it remains unbroken, condoms are proven tools to prevent the transmission of HIV and most sexually transmitted infections (STIs).
- Avoiding ejaculation in the mouth.
- Using water-soluble lubricants during penetration because they reduce the risk of condom tear and facilitate penetration. Oil-based lubricants or creams should never be used.

PREVENTING MOTHER-TO-CHILD TRANSMISSION:

- Thanks to antiretroviral treatment, a mother with HIV who is on treatment and has an undetectable viral load will not transmit the virus to her baby, either during pregnancy or delivery.

PrEP and **PEP** do not replace the regular use of condoms or other prevention methods, as they do not prevent other STIs.

PEP
PrEP

LA PEP
(PRE-EXPOSURE PROPHYLAXIS)

A method of **HIV** prevention for people at a high risk of contracting HIV. PrEP is a tablet medication to be taken orally every day. When taken as prescribed, it is highly effective.

LA PEP
(POST-EXPOSURE PROPHYLAXIS)

Medications taken after a possible exposure to HIV to prevent infection. To be used only in **emergency situations** and taken within 72 hours of possible exposure.

cesida



Subsidized by:



SECRETARÍA DE ESTADO DE SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA
DIVISIÓN DE CONTROL DE VIH, ITS, HEPATITIS VIRALES Y TUBERCULOSIS

**DO NOT DOUBT!
DO NOT DOUBT!**



A young man with curly hair, wearing a brown corduroy shirt over a white t-shirt, stands with his arms outstretched against a background of overlapping colored circles (pink, blue, green, yellow, orange).

GET TESTED!

Check CESIDA's network of associations that perform rapid HIV tests and LEAVE NO DOUBT

SAFE. FREE. CONFIDENTIAL

Knowing if you have HIV will allow you to benefit as soon as possible from medical follow-up and access to effective treatment that will prevent complications in your health and improve your quality of life. You will also be able to protect yourself from reinfection and avoid transmitting HIV to others.

WHEN SHOULD I GET TESTED FOR HIV?

- If you have had a risky practice, do not wait. Go to your healthcare reference centre or another centre where you can get tested for HIV and other STIs. They will evaluate your case, test you and give you advice on how to proceed to receive medical care.
- You have never been tested before and have had sex without using a condom.
- You have had any STI, tuberculosis, or viral hepatitis.
- You have a stable partner, and you want to stop using condoms.
- You think you are pregnant or plan to get pregnant.
- You have shared drug injection equipment (e.g., syringes, needles, spoons or filters) or have used unsterilized equipment for the skin or the mucous membrane (e.g., earrings, piercings and tattoos).



HOW CAN I KNOW IF I HAVE HIV?

The only way to know your HIV status is to **GET TESTED FOR HIV**.

It can take up to **3 months** from the time the infection occurs until the antibodies detected in the test are generated. It is vital to know when you had the last risk practice to know if the result is reliable or if it is convenient to repeat it.

WHERE CAN I GET TESTED FOR HIV?

HIV testing should always be voluntary and confidential and can be performed **free of charge** in health centres of the public healthcare system and in NGOs.

+ + + + +

It can also be done in private clinical analysis laboratories and pharmacies.

+ + + + +

Some STIs centres, NGOs and pharmacies do not ask for a health card.

SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS **STIs**

Sexually transmitted infections (STIs) are infections caused by bacteria, viruses, fungi and parasites that, in most cases, are transmitted during sexual contact, especially during vaginal and anal penetration and oral sex (contact of the mouth with the penis, vulva or anus).

STIs are closely related to HIV infection, not only because they share a common means of transmission, but also because they increase the risk of transmitting or acquiring HIV.

Some may be visible, producing symptoms, such as ulcers, sores (open wounds), secretions or pus, warts or condylomas. Others may have no symptoms, so they may seem to disappear in the absence of treatment; however, this does not mean that the infection has been cured. Most STIs are easily cured and prevented, but if not properly treated, they can have major consequences.

With the above in mind, it is important to be **tested for STIs** in the network of authorised health centres and community centres.

Most frequent STIs:

Human papillomavirus – HPV

Chlamydia

Gonorrhoea

Syphilis

Genital herpes

Hepatitis A, B and C



SYMPTOMS INDICATIVE OF AN STIs:

- ⌚ Sores, welts, warts or blisters near the genitals, anus or mouth.
- ⌚ Itching or stinging around the genitals.
- ⌚ Burning sensation when urinating or defecating.
- ⌚ Swollen nodes in the form of a lump that may or may not be painful in the groin.
- ⌚ In women, thick or foul-smelling vaginal discharge, stinging or pain with urination or sexual intercourse.
- ⌚ In men, purulent (pus-like) discharge from the urethra, pain or stinging.